

内服薬用量詳細

*A	薬剤名	用量換算値	用量	常数	服用回数	通常用法
*A	ゼローダ A (300)	1650mg/㎡/日	~1.30㎡⇒1800mg/日 1.31~1.63㎡⇒2400mg/日 1.64㎡~⇒3000mg/日	(3T. 3T) (4T. 4T) (5T. 5T)	1日2回 内服	21日服用 7日休薬
*B	ゼローダ B (300)	2500mg/㎡/日	~1.32㎡⇒3000mg/日 1.33~1.56㎡⇒3600mg/日 1.57~1.80㎡⇒4200mg/日 1.81㎡~⇒4800mg/日	(5T. 5T) (6T. 6T) (7T. 7T) (8T. 8T)	1日2回 内服	14日服用 7日休薬
*C	ゼローダ C (300)	2000mg/㎡/日	~1.35㎡⇒2400mg/日 1.36~1.65㎡⇒3000mg/日 1.66~1.95㎡⇒3600mg/日 1.96㎡~⇒4200mg/日	(4T. 4T) (5T. 5T) (6T. 6T) (7T. 7T)	1日2回 内服	14日服用 7日休薬
*D	ゼローダ D (300)	1650mg/㎡/日	~1.30㎡⇒1800mg/日 1.31~1.63㎡⇒2400mg/日 1.64㎡~⇒3000mg/日	(3T. 3T) (4T. 4T) (5T. 5T)	1日2回 内服	5日服用 2日休薬 放射線照射日のみ内服
*E	ゼローダ E (300)	1600mg/㎡/日	~1.30㎡⇒1800mg/日 1.31~1.68㎡⇒2400mg/日 1.69~2.06㎡⇒3000mg/日 2.07㎡~⇒3600mg/日	(3T. 3T) (4T. 4T) (5T. 5T) (6T. 6T)	1日2回 内服	14日服用 7日休薬
*1	エスエーワン (20)(25)	80mg/㎡/日	~1.24㎡⇒80mg/日 1.25~1.49㎡⇒100mg/日 1.50㎡~⇒120mg/日	(20)を(2.2) (25)を(2.2) (20)を(3.3)	1日2回 内服	
*2	UFTカプセル/顆粒 (100)		~1.16㎡⇒300mg/日 1.17~1.49㎡⇒400mg/日 1.50~1.83㎡⇒500mg/日 1.84㎡~⇒600mg/日	(1.1.1) (2.1.1) (2.2.1) (2.2.2)	1日3回 内服	
*3	ロンサーフ (15)(20) ★用量の自動計算機能が使用できません。 事前にBSAを算出し用量決定後に 対応量のレジメンを選択して下さい。	70mg/㎡/日	減量時 30mg/日 減量時 40mg/日 減量時 50mg/日 減量時 60mg/日 ~1.06㎡⇒70mg/日 1.07~1.22㎡⇒80mg/日 1.23~1.37㎡⇒90mg/日 1.38~1.52㎡⇒100mg/日 1.53~1.68㎡⇒110mg/日 1.69~1.83㎡⇒120mg/日 1.84~1.98㎡⇒130mg/日 1.99~2.14㎡⇒140mg/日 2.15㎡~⇒150mg/日	(15)1.(15)1) (20)1.(20)1) (20)1.(15)2) (15)2.(15)2) (15)1(20)1.(15)1(20)1) (20)2.(20)2) (15)3.(15)3) (15)2(20)1.(15)2(20)1) (15)1(20)2.(15)1(20)2) (20)3.(20)3) (15)3(20)1.(15)3(20)1) (15)2(20)2.(15)2(20)2) (15)1(20)3.(15)1(20)3)	1日2回 内服	1~5日目服用 6・7日目休薬 8~12日目服用 13・14日目休薬 15~28日目休薬

(注意) 休薬期間の無い(毎日服用の)内服薬のクール日数は、システム上、**28日/クール**で組んでいます。(服用day1~28)

【治験】胃癌 治験用

*	薬剤名	用量換算値	用量	常数	服用回数	通常用法
*5	治験TAS-118顆粒 (40)(50)(60)	80mg/m ² /日	~1. 24m ² ⇒80mg/日 1. 25~1. 49m ² ⇒100mg/日 1. 50m ² ~⇒120mg/日	(40)を(1. 1) (50)を(1. 1) (60)を(1. 1)	1日2回 内服	7日服用 7日休薬
*6	治験S-1カプセル (20)(25)	80mg/m ² /日	~1. 24m ² ⇒80mg/日 1. 25~1. 49m ² ⇒100mg/日 1. 50m ² ~⇒120mg/日	(20)を(2. 2) (25)を(2. 2) (20)を(3. 3)	1日2回 内服	21日服用 14日休薬 (休薬期間が変更になる場合があります)