

10 小細胞肺癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
AMR	カルセド [®]	45mg/m ²	全開	day1. 2. 3	21日	中
テセントリク (初回からの単独使用は不可)	テセントリク	1200mg/body	30分	day1	21日	軽**
CBDCA/CPT-11	カルボプラチン イリノテカン	AUC=5 50mg/m ²	1時間 90分	day1 day1. 8. 15	28日	α/中
CBDCA/VP-16	カルボプラチン ラステット	AUC=5 100mg/m ²	1時間 90分	day1 day1. 2. 3	21日	α/軽
CBDCA/VP-16/テセントリク	カルボプラチン ラステット テセントリク	AUC=5 100mg/m ² 1200mg/body	1時間 90分 30分 (初回1時間)	day1 day1. 2. 3 day1	21日	α/軽
CBDCA/VP-16/イミフィンジ	カルボプラチン ラステット イミフィンジ	AUC=5 100mg/m ² 1500mg/body [体重30kg以下は20mg/kg]	1時間 90分 1時間	day1 day1. 2. 3 day1	21日	α/軽
CDDP/CPT-11	シスプラチン イリノテカン	60mg/m ² 60mg/m ²	2時間 90分	day1 day1. 8. 15	28日	高/中
CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1. 8. 15	28日	中
イミフィンジ (初回からの単独使用は不可)	イミフィンジ	1500mg/body [体重30kg以下は20mg/kg]	1時間	day1	28日	-
PE	シスプラチン ラステット	80mg/m ² 100mg/m ²	2時間 90分	day1 day1. 2. 3	21日	高/軽
CDDP/VP-16/イミフィンジ	シスプラチン ラステット イミフィンジ	80mg/m ² 100mg/m ² 1500mg/body [体重30kg以下は20mg/kg]	2時間 90分 1時間	day1 day1. 2. 3 day1	21日	高/軽
ハイカムチン	ハイカムチン	1mg/m ²	30分	day1~5	21日	軽

** 臨床試験でプレメディケーション規定なし、かつNCCNガイドラインにおいて制吐療法としてのステロイド使用は推奨されない、と記載あるため、制吐剤は必要時処方としています