

## 11 非小細胞肺癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
ジオトリフ (初回は40mg/bodyから)	ジオトリフ	40mg/日 *1回40mgで3週間以上投与し、7レド2以上の副作用が認められない場合は1回50mgに増量可	1日1回 食前	毎日	28日	軽
アレセンサ	アレセンサ	600mg/日	1日2回 食前	毎日	28日	軽
AMR	カルセド	45mg/m <sup>2</sup>	全開	day1. 2. 3	21日	中
テセントリク	テセントリク	1200mg/body	30分 (初回1時間)	day1	21日	軽**
テセントリク/Bev	テセントリク ペバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	30分 (初回1時間) 30分 (初回90分)	day1 day1	21日	軽**
アルンプリグ (初回は90mg/bodyから)	アルンプリグ	180mg/日 *1回90mgで1週間投与し、その後1回180mgに増量	1日1回 内服	毎日	28日	軽
タブレクタ	タブレクタ	800mg/日	1日2回 内服	毎日	28日	軽
Low dose CBDCA (RTx併用時)	カルボプラチン	30mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1~5, 8~12, 15~19, 22~26	42日	中*
CAMP (胸腺腫)	シスプラチン ドキシソルビシン ソルメドロール ソルメドロール	20mg/m <sup>2</sup> 40mg/m <sup>2</sup> 1000mg/body 500mg/body	2時間 全開 30分 30分	day1~4 day1 day1~4 day5. 6	21日	高/高/-
CPT-11	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	90分	day1. 8. 15	28日	中
CPT-11/CDDP	イリノテカン シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	90分 2時間	day1. 8. 15 day1	28日	高/中
ビジンプロ	ビジンプロ	45mg/日	1日1回 内服	毎日	28日	-
タフィンラー/メキニスト	タフィンラー メキニスト	300mg/日 2mg/日	1日2回 食前 1日1回 食前	毎日 毎日	28日	軽
DTX	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	21日	軽
Weekly DTX	ドセタキセル	30mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1. 8	21日	軽
DTX/CDDP (RTx併用時)	ドセタキセル シスプラチン	40mg/m <sup>2</sup> 40mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間	day1. 8 day1. 8	28日	高
DTX/RAM	ドセタキセル サイラムザ	60mg/m <sup>2</sup> 10mg/kg	1時間 30分 (初回1時間)	day1 day1	21日	軽
イミフィンジ	イミフィンジ	10mg/kg	1時間	day1	14日	-
DXR/OPA/CDDP (胸腺腫)	ドキシソルビシン エンドキサン シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup> 50mg/m <sup>2</sup>	全開 30分 2時間	day1 day1 day1	21日	高
ロズリートレク	ロズリートレク	600mg/日	1日1回 内服	毎日	28日	軽
タルセバ	タルセバ	150mg/日	1日1回 食前	毎日	28日	-
タルセバ/RAM	タルセバ サイラムザ	150mg/日 10mg/kg	1日1回 食前 30分 (初回1時間)	毎日 day1	14日	-
GEM	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1. 8. 15	28日	軽
GEM/CDDP/ポートラーザ	ゲムシタピン シスプラチン ポートラーザ	1250mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup> 800mg/body	30分 2時間 1時間	day1. 8 day1 day1. 8	21日	高/軽
ゲフィチニブ	ゲフィチニブ	250mg/日	1日1回 内服	毎日	28日	-
ローブレナ	ローブレナ	100mg/日	1日1回 内服	毎日	28日	-
ポートラーザ	ポートラーザ	800mg/body	1時間	day1. 8	21日	軽
オブジーボ (悪性胸膜中皮腫も使用可)	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
オブジーボ(4週間間隔) (悪性胸膜中皮腫も使用可)	オブジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	-
オブジーボ/ヤーボイ	オブジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1. 22 day1	42日	-/-
タグリッソ	タグリッソ	80mg/日	1日1回 内服	毎日	28日	-
PEM	ベムレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	day1	21日	軽
PEM/Bev (白金薬剤含む3剤併用療法後のみ可)	ベムレキセド ペバシズマブ	500mg/m <sup>2</sup> 15mg/kg	10分 30分	day1 day1	21日	軽
PEM/CBDCA	ベムレキセド カルボプラチン	500mg/m <sup>2</sup> AUC=5	10分 1時間	day1 day1	21日	α
PEM/CBDCA/Bev	ベムレキセド カルボプラチン ペバシズマブ	500mg/m <sup>2</sup> AUC=5 15mg/kg	10分 1時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	α
PEM/CBDCA/オブジーボ/ヤーボイ	ベムレキセド カルボプラチン オブジーボ ヤーボイ	500mg/m <sup>2</sup> AUC=5 360mg/body 1mg/kg	10分 1時間 30分 30分	day1. 22 day1. 22 day1. 22 day1	42日	α/α
PEM/CBDCA/キイトルーダ	ベムレキセド カルボプラチン キイトルーダ	500mg/m <sup>2</sup> AUC=5 200mg/body	10分 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
PEM/CDDP (悪性胸膜中皮腫も使用可)	ベムレキセド シスプラチン	500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	10分 2時間	day1 day1	21日	高
PEM/CDDP/オブジーボ/ヤーボイ	ベムレキセド シスプラチン オブジーボ ヤーボイ	500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup> 360mg/body 1mg/kg	10分 2時間 30分 30分	day1. 22 day1. 22 day1. 22 day1	42日	高/高

PEM/CDDP/キイトルーダ	ベムトレキセド シスプラチン キイトルーダ	500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup> 200mg/body	10分 2時間 30分	day1 day1 day1	21日	高
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	-
PEM/キイトルーダ	ベムトレキセド キイトルーダ	500mg/m <sup>2</sup> 200mg/body	10分 30分	day1 day1	21日	軽
Weekly ab-PTX	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	30分	day1. 8. 15	21日	軽
ab-PTX/CBDCA	アブラキサン カルボプラチン	100mg/m <sup>2</sup> AUC=6	30分 1時間	day1. 8. 15 day1	21日	α/軽
ab-PTX/CBDCA/テセントリク	アブラキサン カルボプラチン テセントリク	100mg/m <sup>2</sup> AUC=6 1200mg/body	30分 1時間 30分 (初回1時間)	day1. 8. 15 day1 day1	21日	α/軽
ab-PTX/CBDCA/キイトルーダ	アブラキサン カルボプラチン キイトルーダ	100mg/m <sup>2</sup> AUC=6 200mg/body	30分 1時間 30分	day1. 8. 15 day1 day1	21日	α/軽
PTX/CBDCA	バクリタキセル カルボプラチン	200mg/m <sup>2</sup> AUC=6	3時間 1時間	day1 day1	21日	α
PTX/CBDCA/テセントリク/Bev	バクリタキセル カルボプラチン テセントリク ペバシズマブ	200mg/m <sup>2</sup> AUC=6 1200mg/body 15mg/kg	3時間 1時間 30分 (初回1時間) 30分 (初回90分)	day1 day1 day1 day1	21日	α
PTX/CBDCA/Bev	バクリタキセル カルボプラチン ペバシズマブ	200mg/m <sup>2</sup> AUC=6 15mg/kg	3時間 1時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	α
PTX/CBDCA/オブジーボ/ヤーポイ	バクリタキセル カルボプラチン オブジーボ ヤーポイ	200mg/m <sup>2</sup> AUC=6 360mg/body 1mg/kg	3時間 1時間 30分 30分	day1. 22 day1. 22 day1. 22 day1	42日	α/α
PTX/CBDCA/キイトルーダ	バクリタキセル カルボプラチン キイトルーダ	200mg/m <sup>2</sup> AUC=6 200mg/body	3時間 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
Weekly PTX/CBDCA (RTx併用時)	バクリタキセル カルボプラチン	40mg/m <sup>2</sup> AUC=2	1時間 1時間	day1. 8. 15. 22. 29. 36 day1. 8. 15. 22. 29. 36 (放射線終了後3週間の休薬が必要)	63日	中
レットヴィモ	レットヴィモ	320mg/日	1日2回 内服	毎日	28日	軽
ルマケラス	ルマケラス	960mg/日	1日1回 内服	毎日	28日	軽
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1/CDDP (RTx併用時)	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	28日***	高/軽
テブミトコ	テブミトコ	500mg/日	1日1回 内服	毎日	28日	軽
UFT	UFT(UFT-E)	*4	1日2~3回 内服	毎日	28日	軽
VNB/CDDP	ロゼウス シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	全開 2時間	day1. 8 day1	21日	高/-
VNB/GEM	ロゼウス ゲムシタピン	25mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	全開 30分	day1. 8 day1. 8	21日	軽
ザーコリ	ザーコリ	500mg/日	1日2回 内服	毎日	28日	中
Weekly CBDCA (臨床試験) (RTx併用時)	カルボプラチン	AUC=2	1時間	day1. 8. 15. 22. 29. 36	42日	中

\* 臨床試験で悪心・嘔吐の出現率が低値であったため、制吐剤は必要時処方としています

\*\* 臨床試験でプレメディケーション規定なし、かつNCCNガイドラインにおいて制吐療法としてのステロイド使用は推奨されない、と記載あるため、制吐剤は必要時処方としています

\*\*\* 次治療がイミファンジレンゲンの場合は当レジメンで発現した毒性の回復確認を必須とした上で1クール期間を21日まで短縮可