11 非小細胞肺癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1ｸｰﾙ	催吐ﾘｽｸ
ジオトリフ (初回は40mg/bodyから)	ジオトリフ	40mg/日 ＊1回40mgで3週間以上投与し、ｸﾞﾚｰﾄﾞ2以上の副作用が認められない場合は1回50mgに増量可	1日1回　食間	毎日	28日	軽
アレセンサ	アレセンサ	600mg/日	1日2回　食間	毎日	28日	軽
AMR	カルセド	45mg/㎡	全開	day1．2．3	21日	中
テセントリク	テセントリク	1200mg/body	30分（初回1時間）	day1	21日	軽＊＊
テセントリク／Bev	テセントリク ベバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	30分（初回1時間） 30分（初回90分）	day1 day1	21日	軽＊＊
アルンブリグ (初回は90mg/bodyから)	アルンブリグ	180mg/日 ＊1回90mgで1週間投与し、その後1回180mgに増量	1日1回　内服	毎日	28日	軽
タブレクタ	タブレクタ	800mg/日	1日2回　内服	毎日	28日	軽
Low dose CBDCA （RTx併用時）	カルボプラチン	30mg/㎡	1時間	day1～5、8～12、15～19、22～26	42日	中＊
CAMP （胸腺腫）	シスプラチン ドキソルビシン ソルメドロール ソルメドロール	20mg/㎡ 40mg/㎡ 1000mg/body 500mg/body	2時間 全開 30分 30分	day1～4 day1 day1～4 day5．6	21日	高/高/-
CPT－11	イリノテカン	100mg/㎡	90分	day1．8．15	28日	中
CPT－11／CDDP	イリノテカン シスプラチン	60mg/㎡ 80mg/㎡	90分 2時間	day1．8．15 day1	28日	高/中
ビジンプロ	ビジンプロ	45mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	-
タフィンラー／メキニスト	タフィンラー メキニスト	300mg/日 2mg/日	1日2回　食間 1日1回　食間	毎日 毎日	28日	軽
DTX	ドセタキセル	60mg/㎡	1時間	day1	21日	軽
Weekly DTX	ドセタキセル	30mg/㎡	1時間	day1．8	21日	軽
DTX／CDDP (RTx併用時)	ドセタキセル シスプラチン	40mg/㎡ 40mg/㎡	1時間 2時間	day1．8 day1．8	28日	高
DTX／RAM	ドセタキセル サイラムザ	60mg/㎡ 10mg/kg	1時間 30分(初回1時間)	day1 day1	21日	軽
イミフィンジ	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	day1	28日	-
DXR／CPA／CDDP （胸腺腫）	ドキソルビシン エンドキサン シスプラチン	50mg/㎡ 500mg/㎡ 50mg/㎡	全開 30分 2時間	day1 day1 day1	21日	高
ロズリートレク	ロズリートレク	600mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	軽
タルセバ	タルセバ	150mg/日	1日1回　食間	毎日	28日	-
タルセバ／RAM	タルセバ サイラムザ	150mg/日 10mg/kg	1日1回　食間 30分(初回1時間)	毎日 day1	14日	-
GEM	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分	day1．8．15	28日	軽
GEM／CDDP／ポートラーザ	ゲムシタビン シスプラチン ポートラーザ	1250mg/㎡ 75mg/㎡ 800mg/body	30分 2時間 1時間	day1．8 day1 day1．8	21日	高/軽
GEM／CDDP／キイトルーダ	ゲムシタビン シスプラチン キイトルーダ	1000mg/㎡ 75mg/㎡ 200mg/body	30分 2時間 30分	day1．8 day1 day1	21日	高/軽
ゲフィチニブ	ゲフィチニブ	250mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	-
ローブレナ	ローブレナ	100mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	-
ポートラーザ	ポートラーザ	800mg/body	1時間	day1．8	21日	軽
オプジーボ （悪性胸膜中皮腫も使用可）	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
オプジーボ(4週間間隔) （悪性胸膜中皮腫も使用可）	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	-
オプジーボ／ヤーボイ	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1．22 day1	42日	-/-
タグリッソ	タグリッソ	80mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	-
PEM	ペメトレキセド	500mg/㎡	10分	day1	21日	軽
PEM／Bev (白金製剤含む3剤併用療法後のみ可)	ペメトレキセド ベバシズマブ	500mg/㎡ 15mg/kg	10分 30分	day1 day1	21日	軽
PEM／CBDCA	ペメトレキセド カルボプラチン	500mg/㎡ AUC＝5	10分 1時間	day1 day1	21日	α
PEM／CBDCA／Bev	ペメトレキセド カルボプラチン ベバシズマブ	500mg/㎡ AUC＝5 15mg/kg	10分 1時間 30分（初回90分）	day1 day1 day1	21日	α
PEM／CBDCA／オプジーボ	ペメトレキセド カルボプラチン オプジーボ	500mg/㎡ AUC＝5 360mg/body	10分 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
PEM／CBDCA／オプジーボ／ヤーボイ	ペメトレキセド カルボプラチン オプジーボ ヤーボイ	500mg/㎡ AUC＝5 360mg/body 1mg/kg	10分 1時間 30分 30分	day1．22 day1．22 day1．22 day1	42日	α/α
PEM／CBDCA／キイトルーダ	ペメトレキセド カルボプラチン キイトルーダ	500mg/㎡ AUC＝5 200mg/body	10分 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α

PEM／CDDP （悪性胸膜中皮腫も使用可）	ペメトレキセド シスプラチン	500mg/㎡ 75mg/㎡	10分 2時間	day1 day1	21日	高
PEM／CDDP／オプジーボ	ペメトレキセド シスプラチン オプジーボ	500mg/㎡ 75mg/㎡ 360mg/body	10分 2時間 30分	day1 day1 day1	21日	高
PEM／CDDP／オプジーボ／ヤーボイ	ペメトレキセド シスプラチン オプジーボ ヤーボイ	500mg/㎡ 75mg/㎡ 360mg/body 1mg/kg	10分 2時間 30分 30分	day1．22 day1．22 day1．22 day1	42日	高/高
PEM／CDDP／キイトルーダ	ペメトレキセド シスプラチン キイトルーダ	500mg/㎡ 75mg/㎡ 200mg/body	10分 2時間 30分	day1 day1 day1	21日	高
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	−
PEM／キイトルーダ	ペメトレキセド キイトルーダ	500mg/㎡ 200mg/body	10分 30分	day1 day1	21日	軽
Weekly ab-PTX	アブラキサン	100mg/㎡	30分	day1．8．15	21日	軽
ab-PTX／CBDCA	アブラキサン カルボプラチン	100mg/㎡ AUC＝6	30分 1時間	day1．8．15 day1	21日	α/軽
ab-PTX／CBDCA／テセントリク	アブラキサン カルボプラチン テセントリク	100mg/㎡ AUC＝6 1200mg/body	30分 1時間 30分（初回1時間）	day1．8．15 day1 day1	21日	α/軽
ab-PTX／CBDCA／キイトルーダ	アブラキサン カルボプラチン キイトルーダ	100mg/㎡ AUC＝6 200mg/body	30分 1時間 30分	day1．8．15 day1 day1	21日	α/軽
PTX／CBDCA	パクリタキセル カルボプラチン	200mg/㎡ AUC＝6	3時間 1時間	day1 day1	21日	α
PTX／CBDCA／テセントリク／Bev	パクリタキセル カルボプラチン テセントリク ベバシズマブ	200mg/㎡ AUC＝6 1200mg/body 15mg/kg	3時間 1時間 30分（初回1時間） 30分（初回90分）	day1 day1 day1 day1	21日	α
PTX／CBDCA／Bev	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	200mg/㎡ AUC＝6 15mg/kg	3時間 1時間 30分（初回90分）	day1 day1 day1	21日	α
PTX／CBDCA／オプジーボ	パクリタキセル カルボプラチン オプジーボ	200mg/㎡ AUC＝6 360mg/body	3時間 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
PTX／CBDCA／オプジーボ／ヤーボイ	パクリタキセル カルボプラチン オプジーボ ヤーボイ	200mg/㎡ AUC＝6 360mg/body 1mg/kg	3時間 1時間 30分 30分	day1．22 day1．22 day1．22 day1	42日	α/α
PTX／CBDCA／キイトルーダ	パクリタキセル カルボプラチン キイトルーダ	200mg/㎡ AUC＝6 200mg/body	3時間 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
Weekly PTX／CBDCA （RTx併用時）	パクリタキセル カルボプラチン	40mg/㎡ AUC＝2	1時間 1時間	day1．8．15．22．29．36 day1．8．15．22．29．36 （放射線終了後2週間の休薬が必要）	56日	中
レットヴィモ	レットヴィモ	320mg/日	1日2回　内服	毎日	28日	軽
ルマケラス	ルマケラス	960mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	軽
S－1	エスエーワン	*1	1日2回　内服	day1～28	35日	軽
S－1／CDDP（RTx併用時）	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/㎡	1日2回　内服 2時間	day1～14 day1	28日＊＊＊	高/軽
テプミトコ	テプミトコ	500mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	軽
UFT	UFT(UFT-E)	*4	1日2～3回　内服	毎日	28日	軽
VNB／CDDP	ロゼウス シスプラチン	25mg/㎡ 80mg/㎡	全開 2時間	day1．8 day1	21日	高/−
VNB／GEM	ロゼウス ゲムシタビン	25mg/㎡ 1000mg/㎡	全開 30分	day1．8 day1．8	21日	軽
ザーコリ	ザーコリ	500mg/日	1日2回　内服	毎日	28日	中
Weekly CBDCA（臨床試験） （RTx併用時）	カルボプラチン	AUC＝2	1時間	day1．8．15．22．29．36	42日	中

＊臨床試験で悪心・嘔吐の出現率が低値であったため、制吐剤は必要時処方としています
＊＊臨床試験でプレメディケーション規定なし、かつNCCNガイドラインにおいて制吐療法としてのステロイド使用は推奨されない、と記載あるため、制吐剤は必要時処方としています
＊＊＊次治療がイミフィンジレジメンの場合は当レジメンで発現した毒性の回復確認を必須とした上で1クール期間を21日まで短縮可