

11 非小細胞肺癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
ジオトリフ (初回は40mg/bodyから)	ジオトリフ	40mg/body * 1回40mgで3週間以上投与し、グレード2以上の副作用が認められない場合は1回50mgに増量可	1日1回 昼食間	毎日	28日	-
アレセンサ	アレセンサ	600mg/body	1日2回 朝食食間	毎日	28日	-
テセントリク	テセントリク	1200mg/body	30分 (初回60分)	day1	21日	軽**
テセントリク/Bev	テセントリク アバステン	1200mg/body 15mg/kg	30分 (初回60分) 30分 (初回90分)	day1 day1	21日	軽**
Low dose CBDCA (RTx併用時)	カルボプラチン	30mg/m ²	1時間	day1~5, 8~12, 15~19, 22~26	42日	中*
CBDCA/CPT-11	カルボプラチン イリノテカン	AUC=5 50mg/m ²	1時間 90分	day1 day1. 8. 15	28日	α/中
CAMP (胸腺腫)	シスプラチン ドキシソルビシン ソルメドロール ソルメドロール	20mg/m ² 40mg/m ² 1000mg/body 500mg/body	2時間 全開 30分 30分	day1~4 day1 day1~4 day5. 6	21日	高/高/-
CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1. 8. 15	28日	中
DTX/CDGP	ドセタキセル アクブラ	60mg/m ² 100mg/m ²	1時間 1時間	day1 day1	21日	中
DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	day1	21日	軽
Weekly DTX	ドセタキセル	30mg/m ²	1時間	day1. 8	21日	軽
DTX/RAM	ドセタキセル サイラムザ	60mg/m ² 10mg/kg	1時間 1時間	day1 day1	21日	軽
イミフィンジ	イミフィンジ	10mg/kg	1時間	day1	14日	-
DXR/CPA/CDDP (胸腺腫)	ドキシソルビシン エンドキササン シスプラチン	50mg/m ² 500mg/m ² 50mg/m ²	全開 30分 2時間	day1 day1 day1	21日	高
タルセバ	タルセバ	150mg/body	1日1回 朝食間	毎日	28日	-
GEM	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1. 8. 15	28日	軽
イレッサ	イレッサ	250mg/body	1日1回 朝食後	毎日	28日	-
オブジーボ (悪性胸膜中皮腫も使用可)	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
タグリッソ	タグリッソ	80mg/body	1日1回 朝食後	毎日	28日	-
PEM	アリムタ	500mg/m ²	10分	day1	21日	軽
PEM/Bev (白金製剤含む3剤併用療法後のみ可)	アリムタ アバステン	500mg/m ² 15mg/kg	10分 30分	day1 day1	21日	軽
PEM/CBDCA	アリムタ カルボプラチン	500mg/m ² AUC=6	10分 1時間	day1 day1	21日	α
PEM/CBDCA/Bev	アリムタ カルボプラチン アバステン	500mg/m ² AUC=6 15mg/kg	10分 1時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	α
PEM/CBDCA/キイトルーダ	アリムタ カルボプラチン キイトルーダ	500mg/m ² AUC=5 200mg/body	10分 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
PEM/CDDP (悪性胸膜中皮腫も使用可)	アリムタ シスプラチン	500mg/m ² 75mg/m ²	10分 2時間	day1 day1	21日	高
PEM/CDDP/Bev	アリムタ シスプラチン アバステン	500mg/m ² 75mg/m ² 15mg/kg	10分 2時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	高
PEM/CDDP/キイトルーダ	アリムタ シスプラチン キイトルーダ	500mg/m ² 75mg/m ² 200mg/body	10分 2時間 30分	day1 day1 day1	21日	高
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	-
PEM/キイトルーダ	アリムタ キイトルーダ	500mg/m ² 200mg/body	10分 30分	day1 day1	21日	軽
Weekly ab-PTX	アブラキサン	100mg/m ²	30分	day1. 8. 15	21日	軽
ab-PTX/CBDCA	アブラキサン カルボプラチン	100mg/m ² AUC=6	30分 1時間	day1. 8. 15 day1	21日	α/軽
ab-PTX/CBDCA/キイトルーダ	アブラキサン カルボプラチン キイトルーダ	100mg/m ² AUC=6 200mg/body	30分 1時間 30分	day1. 8. 15 day1 day1	21日	α/軽
PTX/CBDCA	パクリタキセル	200mg/m ²	3時間	day1	21日	α

	カルボプラチン	AUC=6	1時間	day1		
PTX/CBDCA/キイトルーダ	パクリタキセル カルボプラチン キイトルーダ	200mg/m ² AUC=6 200mg/body	3時間 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
PTX/CBDCA/テセントリク/Bev	パクリタキセル カルボプラチン テセントリク アバステン	200mg/m ² AUC=6 1200mg/body 15mg/kg	3時間 1時間 30分 (初回60分) 30分 (初回90分)	day1 day1 day1 day1	21日	α
PTX/CBDCA/Bev	パクリタキセル カルボプラチン アバステン	200mg/m ² AUC=6 15mg/kg	3時間 1時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	α
Weekly PTX/CBDCA (RTx併用時)	パクリタキセル カルボプラチン	40mg/m ² AUC=2	1時間 1時間	day1. 8. 15. 22. 29. 36 day1. 8. 15. 22. 29. 36	63日	中
				(放射線終了後3週間の休薬が必要)		
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1/CBDCA	エスエーワン カルボプラチン	*1 AUC=5	1日2回 内服 1時間	day1~14 day1	21日	α/軽
S-1/CDDP (RTx併用時)	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/m ²	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	28日***	高/軽
UFT	UFT(UFT-E)	*2	1日3回 内服	毎日	28日	軽
VNB	ナベルピン	25mg/m ²	全開	day1. 8	21日	-
VNB/CDDP	ナベルピン シスプラチン	25mg/m ² 80mg/m ²	全開 2時間	day1. 8 day1	21日	高/-
VNB/GEM	ナベルピン ゲムシタピン	25mg/m ² 1000mg/m ²	全開 30分	day1. 8 day1. 8	21日	軽
ザーコリ	ザーコリ	500mg/body	1日2回 内服	毎日	28日	中
GEM/CBDCA (臨床試験)	ゲムシタピン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC=3	30分 1時間	day1. 15 day1. 15	28日	中
GEM (臨床試験)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1. 15	28日	軽
S-1 (臨床試験)	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
S-1/CDDP (臨床試験)	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/m ²	1日2回 内服 2時間	day1~21 day8	35日	軽/高/軽

* 臨床試験で悪心・嘔吐の出現率が低値であったため、制吐剤は必要時処方としています

** 臨床試験でプレメディケーション規定なし、かつNCCNガイドラインにおいて制吐療法としてのステロイド使用は推奨されない、と記載あるため、制吐剤は必要時処方としています

*** 次治療がイミフィンジレジメンの場合は当レジメンで発現した毒性の回復確認を必須とした上で1クール期間を21日まで短縮可