

# 13 胃癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
CPT-11	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	90分	day1. 8. 15	28日	中
Biweekly CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	14日	α
DTX	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	21日	軽
エンハーツ	エンハーツ	6. 4mg/kg	30分 (初回90分)	day1	21日	中
FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	24時間 2時間	day1~5 day1	21日	高/軽
FP/トラスツズマブ	フルオロウラシル シスプラチン トラスツズマブ	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	24時間 2時間 30分 (90分)	day1~5 day1 day1	21日	高/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽*
mFOLFOX6/オブジーボ	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン オブジーボ	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 240mg/body	2時間 全開 46時間 2時間 30分	day1 day1 day1-2 day1 day1	14日	α/軽*
mFOLFOX6/トラスツズマブ	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン トラスツズマブ	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg)	2時間 全開 46時間 2時間 30分 (90分)	day1. 15. 29 day1. 15. 29 day1-2. 15-16. 29-30 day1. 15. 29 day1. 22	42日	α/軽/α/軽/ -/α/軽*
LV/5-FU (RPMI)	レボホリナート フルオロウラシル	250mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開	day1. 8. 15. 22. 29. 36 day1. 8. 15. 22. 29. 36	8週	軽
ロンサーフ ★用量の自動計算機能が使用できません。 事前にBSAを算出し用量決定後に対応量のレジメンを選択して下さい。	ロンサーフ	*3	1日2回 内服	day1~5. 8~12	28日	中
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
オブジーボ(4週間間隔)	オブジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	-
オブジーボ(3週間間隔) (初回からの単独使用は不可)	オブジーボ	360mg/body	30分	day1	21日	-
Weekly ab-PTX	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	30分	day1. 8. 15	28日	軽
Weekly ab-PTX/RAM	アブラキサン サイラムザ	100mg/m <sup>2</sup> 8mg/kg	30分 30分(初回1時間)	day1. 8. 15 day1. 15	28日	軽/軽/軽
PTX	バクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1. 8. 15	28日	軽
PTX/RAM	バクリタキセル サイラムザ	80mg/m <sup>2</sup> 8mg/kg	1時間 30分(初回1時間)	day1. 8. 15 day1. 15	28日	軽/軽/軽
RAM(サイラムザ)	サイラムザ	8mg/kg	30分(初回1時間)	day1	14日	-
SOX	エスエーワン オキサリプラチン	*1 130mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	α/軽*
SOX/オブジーボ	エスエーワン オキサリプラチン オブジーボ	*1 130mg/m <sup>2</sup> 360mg/body	1日2回 内服 2時間 30分	day1~14 day1 day1	21日	α/軽*
SOX/トラスツズマブ	エスエーワン オキサリプラチン トラスツズマブ	*1 130mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1~14 day1 day1	21日	α/軽*
S-1/トラスツズマブ	エスエーワン トラスツズマブ	*1 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 30分 (90分)	day1~14 day1	21日	軽/軽

S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1 (2投1休)	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
S-1/CDDP	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~21 day8	35日	軽/高
S-1/CDDP(3週)	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	高/軽
S-1/CDDP/トラスツズマブ(3週)	エスエーワン シスプラチン トラスツズマブ	*1 60mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1~14 day1 day1	21日	高/軽
S-1/DTX	エスエーワン ドセタキセル	*1 40mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 1時間	day1~14 day1	21日	軽/軽
S-1/オブジーボ <small>SOX/オブジーボ 施行患者において副作用による L-OHP中止時に使用</small>	エスエーワン オブジーボ	*1 360mg/body	1日2回 内服 30分	day1~14 day1	21日	軽/軽
カペシタピンC/CDDP	カペシタピン シスプラチン	C法 *C 80mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	高/軽
カペシタピンC/CDDP/トラスツズマブ	カペシタピン シスプラチン トラスツズマブ	C法 *C 80mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1~14 day1 day1	21日	高/軽
カペシタピンC/トラスツズマブ <small>カペシタピンC/CDDP/トラスツズマブ、CAPOX/トラスツズマブ 施行患者に おいて副作用によるPt系薬中止時に使用</small>	カペシタピン トラスツズマブ	C法 *C 6mg/kg (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 30分 (90分)	day1~14 day1	21日	軽/軽
CAPOX	カペシタピン オキサリプラチン	C法 *C 130mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	α/軽 *
CAPOX/オブジーボ	カペシタピン オキサリプラチン オブジーボ	C法 *C 130mg/m <sup>2</sup> 360mg/body	1日2回 内服 2時間 30分	day1~14 day1 day1	21日	α/軽 *
CAPOX/トラスツズマブ	カペシタピン オキサリプラチン トラスツズマブ	C法 *C 130mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg)	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1~14 day1 day1	21日	α/軽 *

\* 当院ではオキサリプラチン含有レジメンは中等度+オプション(α)の制吐療法を適用します  
\* トラスツズマブのローディング用レジメンは、トラスツズマブ投与予定日から1週間を超えた後に適用可能です