13 胃癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
CPT－11	イリノテカン	100mg/㎡	90分	day1. 8. 15	28日	中
Biweekly CPT－11	イリノテカン	150mg/㎡	90分	day1	14日	α
DTX	ドセタキセル	60mg/㎡	1時間	day1	21日	軽
エンハーツ	エンハーツ	6. 4mg/kg	30分（初回90分）	day1	21日	中
FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/㎡ 80mg/㎡	24時間 2時間	day1～5 day1	21日	高/軽
FP／トラスツズマブ	フルオロウラシル シスプラチン トラスツズマブ	800mg/㎡ 80mg/㎡ 6mg/kg （初回時 8mg/kg） （＊＊ローディング時 8mg/kg）	24時間 2時間 30分 (90分)	day1～5 day1 day1	21日	高/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡ 85mg/㎡	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1－2 day1	14日	α/軽＊
mFOLFOX6／オプジーボ	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン オプジーボ	200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡ 85mg/㎡ 240mg/body	2時間 全開 46時間 2時間 30分	day1 day1 day1－2 day1 day1	14日	α/軽＊
mFOLFOX6／ビロイ	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン ビロイ	200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡ 85mg/㎡ 400mg/㎡ （初回時 800mg/㎡）	2時間 全開 46時間 2時間 4時間	day1 day1 day1－2 day1 day1	14日	高/軽
mFOLFOX6／トラスツズマブ	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン トラスツズマブ	200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡ 85mg/㎡ 6mg/kg （初回時 8mg/kg）	2時間 全開 46時間 2時間 30分 （90分）	day1. 15. 29 day1. 15. 29 day1－2. 15－16. 29－30 day1. 15. 29 day1. 22	42日	α/軽/α/軽/ －/α/軽＊
LV／5－FU（RPMI）	レボホリナート フルオロウラシル	250mg/㎡ 600mg/㎡	2時間 全開	day1. 8. 15. 22. 29. 36 day1. 8. 15. 22. 29. 36	8週	軽
ロンサーフ ★用量の自動計算機能が使用できません。 事前にBSAを算出し用量決定後に対応量のレジメンを選択して下さい。	ロンサーフ	*3	1日2回 内服	day1～5. 8～12	28日	中
オプジーボ	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	－
オプジーボ（4週間間隔）	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	－
オプジーボ（3週間間隔） （初回からの単独使用は不可）	オプジーボ	360mg/body	30分	day1	21日	－
Weekly ab-PTX	アブラキサン	100mg/㎡	30分	day1. 8. 15	28日	軽
Weekly ab-PTX／RAM	アブラキサン サイラムザ	100mg/㎡ 8mg/kg	30分 30分（初回1時間）	day1. 8. 15 day1. 15	28日	軽/軽/軽
PTX	パクリタキセル	80mg/㎡	1時間	day1. 8. 15	28日	軽
PTX／RAM	パクリタキセル サイラムザ	80mg/㎡ 8mg/kg	1時間 30分（初回1時間）	day1. 8. 15 day1. 15	28日	軽/軽/軽
RAM（サイラムザ）	サイラムザ	8mg/kg	30分（初回1時間）	day1	14日	―
SOX	エスエーワン オキサリプラチン	*1 130mg/㎡	1日2回 内服 2時間	day1～14 day1	21日	α/軽 ＊
SOX／オプジーボ	エスエーワン オキサリプラチン オプジーボ	*1 130mg/㎡ 360mg/body	1日2回 内服 2時間 30分	day1～14 day1 day1	21日	α/軽 ＊
SOX／キイトルーダ	エスエーワン オキサリプラチン キイトルーダ	*1 130mg/㎡ 200mg/body	1日2回 内服 2時間 30分	day1～14 day1 day1	21日	α/軽 ＊
SOX／トラスツズマブ	エスエーワン オキサリプラチン トラスツズマブ	*1 130mg/㎡ 6mg/kg （初回時 8mg/kg） （＊ローディング時 8mg/kg）	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1～14 day1 day1	21日	α/軽 ＊

S－1／トラスツズマブ	エスエーワン トラスツズマブ	*1 6mg/kg （初回時　8mg/kg） （＊ローディング時　8mg/kg）	1日2回　内服 30分 (90分)	day1～14 day1	21日	軽/軽
S－1	エスエーワン	*1	1日2回　内服	day1～28	35日	軽
S－1（2投1休）	エスエーワン	*1	1日2回　内服	day1～14	21日	軽
S－1／CDDP	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/㎡	1日2回　内服 2時間	day1～21 day8	35日	軽/高
S－1／CDDP（3週）	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/㎡	1日2回　内服 2時間	day1～14 day1	21日	高/軽
S－1／CDDP／トラスツズマブ（3週）	エスエーワン シスプラチン トラスツズマブ	*1 60mg/㎡ 6mg/kg （初回時　8mg/kg） （＊ローディング時　8mg/kg）	1日2回　内服 2時間 30分 (90分)	day1～14 day1 day1	21日	高/軽
S－1／DTX	エスエーワン ドセタキセル	*1 40mg/㎡	1日2回　内服 1時間	day1～14 day1	21日	軽/軽
S－1／オプジーボ SOX/オプジーボ施行患者において副作用による L-OHP中止時に使用	エスエーワン オプジーボ	*1 360mg/body	1日2回　内服 30分	day1～14 day1	21日	軽/軽
S－1／キイトルーダ SOX/キイトルーダ施行患者において副作用による L-OHP中止時に使用	エスエーワン キイトルーダ	*1 200mg/body	1日2回　内服 30分	day1～14 day1	21日	軽/軽
カペシタビンC／CDDP	カペシタビン シスプラチン	C法　*C 80mg/㎡	1日2回　内服 2時間	day1～14 day1	21日	高/軽
カペシタビンC／CDDP／トラスツズマブ	カペシタビン シスプラチン トラスツズマブ	C法　*C 80mg/㎡ 6mg/kg （初回時　8mg/kg） （＊ローディング時　8mg/kg）	1日2回　内服 2時間 30分 (90分)	day1～14 day1 day1	21日	高/軽
カペシタビンC／トラスツズマブ カペシタビンC/CDDP/ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ、CAPOX/ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ施行患者において副作用によるPt系薬中止時に使用	カペシタビン トラスツズマブ	C法　*C 6mg/kg （＊ローディング時　8mg/kg）	1日2回　内服 30分 (90分)	day1～14 day1	21日	軽/軽
CAPOX	カペシタビン オキサリプラチン	C法　*C 130mg/㎡	1日2回　内服 2時間	day1～14 day1	21日	α/軽　＊
CAPOX／オプジーボ	カペシタビン オキサリプラチン オプジーボ	C法　*C 130mg/㎡ 360mg/body	1日2回　内服 2時間 30分	day1～14 day1 day1	21日	α/軽　＊
CAPOX／キイトルーダ	カペシタビン オキサリプラチン キイトルーダ	C法　*C 130mg/㎡ 200mg/body	1日2回　内服 2時間 30分	day1～14 day1 day1	21日	α/軽　＊
CAPOX／ビロイ	カペシタビン オキサリプラチン ビロイ	C法　*C 130mg/㎡ 600mg/㎡ （初回時　800mg/㎡）	1日2回　内服 2時間 4時間	day1～14 day1 day1	21日	高/軽
CAPOX／トラスツズマブ	カペシタビン オキサリプラチン トラスツズマブ	C法　*C 130mg/㎡ 6mg/kg （初回時　8mg/kg）	1日2回　内服 2時間 30分 （90分）	day1～14 day1 day1	21日	α/軽　＊

＊当院ではオキサリプラチン含有レジメンは中等度＋オプション（α）の制吐療法を適用します
＊＊トラスツズマブのローディング用レジメンは、トラスツズマブ投与予定日から1週間を超えた後に適用可能です