14 食道癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1ｸｰﾙ	催吐ﾘｽｸ
DTX	ドセタキセル	70mg/㎡	1時間	day1	21日	軽
DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	60mg/㎡ 70mg/㎡ 600mg/㎡	1時間 2時間 24時間	day1 day1 day1～5	28日	高/軽
DCF（術前）	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/㎡ 70mg/㎡ 750mg/㎡	1時間 2時間 24時間	day1 day1 day1～5	21日	高/軽
High dose FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/㎡ 80mg/㎡	24時間 2時間	day1～5 day1	28日	高/軽
FP／オプジーボ	フルオロウラシル シスプラチン オプジーボ	800mg/㎡ 80mg/㎡ 480mg/body	24時間 2時間 30分	day1～5 day1 day1	28日	高/軽
FP／キイトルーダ	フルオロウラシル シスプラチン キイトルーダ	800mg/㎡ 80mg/㎡ 200mg/body	24時間 2時間 30分	day1～5 day1 day1	21日	高/軽
5－FU／キイトルーダ	フルオロウラシル キイトルーダ	800mg/㎡ 200mg/body	24時間 30分	day1～5 day1	21日	軽/軽
High dose 5－FU/CDGP	フルオロウラシル アクプラ	800mg/㎡ 90mg/㎡	24時間 2時間	day1～5 day1	28日	中/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡ 85mg/㎡	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1－2 day1	14日	α/軽＊
オプジーボ	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	－
オプジーボ(4週間間隔)	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	－
オプジーボ／ヤーボイ	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1. 22 day1	42日	－/－
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	－
PTX	パクリタキセル	100mg/㎡	1時間	day1. 8. 15. 22. 29. 36.	49日	軽
S－1	エスエーワン	*1	1日2回　内服	day1～28	35日	軽

＊当院ではオキサリプラチン含有レジメンは中等度＋オプション（α）の制吐療法を適用します