

# 14 食道癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
DTX	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	21日	軽
DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	60mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 24時間	day1 day1 day1～5	28日	高/軽
DCF(術前)	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup> 750mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 24時間	day1 day1 day1～5	21日	高/軽
High dose FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	24時間 2時間	day1～5 day1	28日	高/軽
FP/オブジーボ	フルオロウラシル シスプラチン オブジーボ	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> 480mg/body	24時間 2時間 30分	day1～5 day1 day1	28日	高/軽
FP/キイトルーダ	フルオロウラシル シスプラチン キイトルーダ	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> 200mg/body	24時間 2時間 30分	day1～5 day1 day1	21日	高/軽
5-FU/キイトルーダ	フルオロウラシル キイトルーダ	800mg/m <sup>2</sup> 200mg/body	24時間 30分	day1～5 day1	21日	軽/軽
High dose 5-FU/CDGP	フルオロウラシル アクトラ	800mg/m <sup>2</sup> 90mg/m <sup>2</sup>	24時間 2時間	day1～5 day1	28日	中/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽*
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
オブジーボ(4週間間隔)	オブジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	-
オブジーボ/ヤーボイ	オブジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1. 22 day1	42日	-/-
PTX	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1. 8. 15. 22. 29. 36.	49日	軽
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1～28	35日	軽

\* 当院ではオキサリプラチン含有レジメンは中等度+オブション(α)の制吐療法を適用します