

14 食道癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	day1	21日	軽
High dose FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	24時間 2時間	day1~5 day1	28日	高/軽
FP/ニボルマブ	フルオロウラシル シスプラチン オブジーボ	800mg/m ² 80mg/m ² 480mg/body	24時間 2時間 30分	day1~5 day1 day1	28日	高/軽
FP/ペムブロリズマブ	フルオロウラシル シスプラチン キイトルーダ	800mg/m ² 80mg/m ² 200mg/body	24時間 2時間 30分	day1~5 day1 day1	21日	高/軽
FP/チスレリズマブ	フルオロウラシル シスプラチン テビムブラ	800mg/m ² 80mg/m ² 200mg/body	24時間 2時間 30分 (初回1時間)	day1~5 day1 day1	21日	高/軽
DCF	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	60mg/m ² 70mg/m ² 600mg/m ²	1時間 2時間 24時間	day1 day1 day1~5	28日	高/軽
DCF(術前)	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m ² 70mg/m ² 750mg/m ²	1時間 2時間 24時間	day1 day1 day1~5	21日	高/軽
High dose 5-FU/NDP	フルオロウラシル アクプラ	800mg/m ² 90mg/m ²	24時間 2時間	day1~5 day1	28日	中/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ²	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
FOLFOX(RTx併用時)	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m ² 400mg/m ² 1600mg/m ² 85mg/m ²	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
5-FU/ペムブロリズマブ	フルオロウラシル キイトルーダ	800mg/m ² 200mg/body	24時間 30分	day1~5 day1	21日	軽/軽
ニボルマブ	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
ニボルマブ(4週間間隔)	オブジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	-
ニボルマブ/イピリムマブ	オブジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1, 22 day1	42日	-/-
PTX	パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	day1, 8, 15, 22, 29, 36	49日	軽
ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	-
ペムブロリズマブ(6週間間隔)	キイトルーダ	400mg/body	30分	day1	42日	-
チスレリズマブ	テビムブラ	200mg/body	30分 (初回1時間)	day1	21日	-
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽