

15 結腸・直腸癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
カペシタピンB (術後補助療法)	カペシタピン	B法 *B	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
カペシタピンC	カペシタピン	C法 *C	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
カペシタピンD (RTx併用時)	カペシタピン	D法 *D	1日2回 内服(*) *土日は休業 放射線照射日のみ内服	day1~5 day8~12 day15~19 day22~26 day29~33 day36~38	52日	軽
カペシタピンC/Bmab	カペシタピン ペバシズマブ	C法 *C 7.5mg/kg	1日2回 内服 30分 (初回90分)	day1~14 day1	21日	軽/軽
CAPIRI/Bmab	カペシタピン イリノテカン ペバシズマブ	E法 *E 200mg/m ² 7.5mg/kg	1日2回 内服 90分 30分 (初回90分)	day1~14 day1 day1	21日	中/軽
CAPOX	カペシタピン オキサリプラチン	C法 *C 130mg/m ²	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	中/軽
CAPOX/Bmab	カペシタピン オキサリプラチン ペバシズマブ	C法 *C 130mg/m ² 7.5mg/kg	1日2回 内服 2時間 30分 (初回90分)	day1~14 day1 day1	21日	中/軽
Cmab	アービタックス	500mg/m ²	2時間	day1	14日	-
Cmab/エンコラフェニブ	アービタックス ピラフトビ	500mg/m ² 300mg/日	2時間 1日1回 内服	day1 毎日	14日	中/軽***
Cmab/エンコラフェニブ/ビニメチニブ	アービタックス ピラフトビ メクトビ	500mg/m ² 300mg/日 90mg/日	2時間 1日1回 内服 1日2回 内服	day1 毎日 毎日	14日	中/軽***
LV/FU	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	2時間 全開 46時間	day1 day1 day1-2	14日	軽/軽
LV/FU/Bmab	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ペバシズマブ	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 5mg/kg	2時間 全開 46時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1-2 day1	14日	軽/軽
LV/FU/Cmab	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル アービタックス	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 500mg/m ²	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	軽/軽
FOLFIRI	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ²	2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
FOLFIRI/アフリペルセプト	ザルトラップ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	4mg/kg 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ²	1時間 2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
FOLFIRI/Bmab	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン ペバシズマブ	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ² 5mg/kg	2時間 全開 46時間 90分 30分 (初回90分)	day1 day1 day1-2 day1 day1	14日	中/軽
FOLFIRI/Cmab	アービタックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	500mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ²	2時間 2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
FOLFIRI/Pmab	ベクティビックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	6mg/kg 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ²	1時間 2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
FOLFIRI/RAM	サイラムザ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	8mg/kg 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ²	30分 (初回1時間) 2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
MMC/5-FU (肛門癌)	マイトマイシン フルオロウラシル	10mg/m ² 1000mg/m ²	全開 24時間	day1 day1~4	28日	軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ²	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
mFOLFOX6/Bmab	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン ペバシズマブ	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ² 5mg/kg	2時間 全開 46時間 2時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1-2 day1 day1	14日	中/軽
mFOLFOX6/Cmab	アービタックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	500mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ²	2時間 2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽

mFOLFOX6/ Cmab/エンコラフェニブ	アービタックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン ピラフトビ	500mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ² 300mg/日	2時間 2時間 全開 46時間 2時間 1日1回 内服	day1 day1 day1 day1-2 day1 毎日	14日	中/軽
mFOLFOXIRI	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	150mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	1時間 2時間 2時間 46時間	day1 day1 day1 day1-2	14日	高/軽
mFOLFOXIRI/Bmab	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル ペバシズマブ	150mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ² 5mg/kg	1時間 2時間 2時間 46時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	高/軽
mFOLFOXIRI/Cmab**	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル アービタックス	150mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ² 500mg/m ²	1時間 2時間 2時間 46時間 2時間	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	高/軽
mFOLFOX6/Pmab	ベクティビックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	6mg/kg 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ²	1時間 2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	中/軽
LV/FU/Pmab	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ベクティビックス	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 6mg/kg	2時間 全開 46時間 1時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	軽/軽
フルキンチニブ	フルキザクラ	5mg/日	1日1回 内服	day1~21	28日	軽
FTD/TPI	ロンサーフ	*3	1日2回 内服	day1~5. 8~12	28日	中
FTD/TPI/Bmab	ロンサーフ ペバシズマブ	*3 5mg/kg	1日2回 内服 30分 (初回90分)	day1~5. 8~12 day1. 15	28日	中/中/-
ニボルマブ (MSI-High腫瘍)	オプジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
ニボルマブ(4週間間隔) (MSI-High腫瘍)	オプジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	-
ニボルマブ/イピリムマブ (MSI-High腫瘍)	オプジーボ ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1 day1	21日	-
Pmab	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日	-
ペムブロリズマブ (MSI-High腫瘍)	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	-
ペムブロリズマブ(6週間間隔) (MSI-High腫瘍)	キイトルーダ	400mg/body	30分	day1	42日	-
レゴラフェニブ	スチパーガ	160mg/日	1日1回 内服	day1~21	28日	軽
トラスツズマブ/ペルツズマブ	トラスツズマブ パージェタ	6mg/kg (初回時 8mg/kg) 420mg/body (初回時 840mg/body)	30分 (90分) 30分 (60分)	day1 day1	21日	-
S-1(4投2休)	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	42日	軽
S-1/Bmab	エスエーワン ペバシズマブ	*1 7.5mg/kg	1日2回 内服 30分 (初回90分)	day1~14 day1	21日	軽/軽
IRIS	エスエーワン イリノテカン	*1 150mg/m ²	1日2回 内服 90分	day1~14 day1	21日	中/軽
IRIS/Bmab	エスエーワン イリノテカン ペバシズマブ	*1 150mg/m ² 7.5mg/kg	1日2回 内服 90分 30分 (初回90分)	day1~14 day1 day1	21日	中/軽
SOX	エスエーワン オキサリプラチン	*1 130mg/m ²	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	中/軽
SOX/Bmab	エスエーワン オキサリプラチン ペバシズマブ	*1 130mg/m ² 7.5mg/kg	1日2回 内服 2時間 30分 (初回90分)	day1~14 day1 day1	21日	中/軽
UFT	UFT(UFT-E)	*2	1日3回 内服	毎日	-	軽
UFT/LV	ホリナート UFT(UFT-E)	75mg/body *2	1日3回 8時間毎・食間 1日3回 8時間毎・食間	day1~28 day1~28	35日	軽

** 当院の委員会にて承認済み。医師の判断にて対象患者のみ使用可

*** ガイドラインでは中等度催吐性リスクですが、当院では軽度催吐性リスクとして対応します