

# 15 結腸・直腸癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
カペシタビンB (術後補助療法 (結腸癌))	カペシタビン	B法 *B	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
カペシタビンC	カペシタビン	C法 *C	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
カペシタビンC/Bev	カペシタビン ペバシズマブ	C法 *C 7.5mg/kg	1日2回 内服 30分 (初回90分)	day1~14 day1	21日	軽/軽
カペシタビンD (RTx併用時)	カペシタビン	D法 *D	1日2回 内服 (* * 土日は休薬 放射線照射日のみ内服)	day1~5 day8~12 day15~19 day22~26 day29~33 day36~38	52日	軽
ピラフトビ/Cet	アービタックス ピラフトビ	250mg/m <sup>2</sup> (初回時 400mg/m <sup>2</sup> ) 300mg/日	1時間 (2時間) 1日1回 内服	day1 毎日	7日	中/中
ピラフトビ/メクトビ/Cet	アービタックス ピラフトビ メクトビ	250mg/m <sup>2</sup> (初回時 400mg/m <sup>2</sup> ) 300mg/日 90mg/日	1時間 (2時間) 1日1回 内服 1日2回 内服	day1 毎日 毎日	7日	中/中
FOLFIRI	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
FOLFIRI/AFL	ザルトラップ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	4mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
FOLFIRI/Bev(5)	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン ペバシズマブ	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 5mg/kg	2時間 全開 46時間 90分 30分 (初回90分)	day1 day1 day1-2 day1 day1	14日	α/軽
FOLFIRI/Cet	アービタックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	500mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
FOLFIRI/Pmab	ベクティビックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	6mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
FOLFIRI/RAM	サイラムザ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	8mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	30分 (初回1時間) 2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽*
mFOLFOX6/Bev(5)	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン ペバシズマブ	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 5mg/kg	2時間 全開 46時間 2時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1-2 day1 day1	14日	α/軽*
mFOLFOX6/Cet	アービタックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	500mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽*
mFOLFOX6/Pmab	ベクティビックス レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	6mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽*
mFOLFOXIRI	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	150mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 2時間 46時間	day1 day1 day1 day1-2	14日	高/軽

mFOLFOXIRI/Bev	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル ペバシズマブ	150mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 5mg/kg	1時間 2時間 2時間 46時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	高/軽
トラスツズマブ/Per	トラスツズマブ パージェタ	6mg/kg (初回時 8mg/kg) 420mg/body (初回時 840mg/body)	30分 (90分) 30分 (60分)	day1 day1	21日	-
IRIS	エスエーワン イリノテカン	*1 150mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 90分	day1~14 day1	21日	α/軽
IRIS/Bev	エスエーワン イリノテカン ペバシズマブ	*1 150mg/m <sup>2</sup> 7.5mg/kg	1日2回 内服 90分 30分 (初回90分)	day1~14 day1 day1	21日	α/軽
ロンサーフ	ロンサーフ ★用量の自動計算機能が使用できません。 事前にBSAを算出し用量決定後に対応量のレジメンを選択して下さい。	*3	1日2回 内服	day1~5. 8~12	28日	中
ロンサーフ/Bev	ロンサーフ ペバシズマブ ★ロンサーフは用量の自動計算機能が使用できません。 事前にBSAを算出し用量決定後に対応量のレジメンを選択して下さい。	*3 5mg/kg	1日2回 内服 30分 (初回90分)	day1~5. 8~12 day1. 15	28日	中/中/-
MMC/5-FU (肛門癌)	マイトマイシン フルオロウラシル	10mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	全開 24時間	day1 day1~4	28日	軽
オブジーボ (MSI-High腫瘍)	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
オブジーボ(4週間間隔) (MSI-High腫瘍)	オブジーボ	480mg/body	30分	day1	28日	-
オブジーボ/ヤーボイ (MSI-High腫瘍)	オブジーボ ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	30分 30分	day1 day1	21日	-
キイトルーダ (MSI-High腫瘍)	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	-
Pmab (ヘクティビックス)	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日	-
sLV5FU2	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間	day1 day1 day1-2	14日	軽/軽
sLV5FU2/Bev(5)	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ペバシズマブ	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 5mg/kg	2時間 全開 46時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1-2 day1	14日	軽/軽
sLV5FU2/Cet	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル アービタックス	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	軽/軽
sLV5FU2/Pmab	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル ベクティビックス	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg	2時間 全開 46時間 1時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	軽/軽
ステパーガ	ステパーガ	160mg/日	1日1回 内服	day1~21	28日	軽
SOX	エスエーワン オキサリプラチン	*1 130mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	α/軽*
SOX/Bev	エスエーワン オキサリプラチン ペバシズマブ	*1 130mg/m <sup>2</sup> 7.5mg/kg	1日2回 内服 2時間 30分 (初回90分)	day1~14 day1 day1	21日	α/軽*
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1/Bev	エスエーワン ペバシズマブ	*1 7.5mg/kg	1日2回 内服 30分 (初回90分)	day1~14 day1	21日	軽/軽
UFT/LV	ホリナート UFT(UFT-E)	75mg/body *2	1日3回 8時間毎・食間 1日3回 8時間毎・食間	day1~28 day1~28	35日	軽
CAPIRI/Bev	カベシタピン イリノテカン ペバシズマブ	E法 *E 200mg/m <sup>2</sup> 7.5mg/kg	1日2回 内服 90分 30分 (初回90分)	day1~14 day1 day1	21日	α/軽
CAPOX	カベシタピン オキサリプラチン	C法 *C 130mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	α/軽*
CAPOX/Bev	カベシタピン オキサリプラチン ペバシズマブ	C法 *C 130mg/m <sup>2</sup> 7.5mg/kg	1日2回 内服 2時間 30分 (初回90分)	day1~14 day1 day1	21日	α/軽*
mFOLFOXIRI/Cet**	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル アービタックス	150mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 2時間 46時間 2時間	day1 day1 day1 day1-2 day1	14日	高/軽

\* 当院ではオキサリプラチン含有レジメンは中等度+オプション(α)の嘔吐療法を適用します

\*\* 当院の委員会にて承認済み。医師の判断にて対象患者のみ使用可