15 結腸・直腸癌化学療法レジメン

			「永Дレン			
療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
カペシタビンB(術後補助療法	カペシタビン	B法 *B	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
(結腸癌)						
カペシタビンC	カペシタビン	C法 *C	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
カペシタビンC/Bev	カペシタビン	C法 *C	1日2回 内服	day1~14	21日	軽/軽
	ベバシズマブ	7. 5mg/kg	30分(初回90分)	day1		
カペシタビンD (RTx併用時)	カペシタビン	D法 *D	1日2回 内服(*)	day1~5	52日	軽
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	J.4 - J	* 土日は休薬	day8~12		T-1
			放射線照射日のみ内服	day15~19		
			Way lok 24 and 1 and 2 a Le 2018	day22~26		
				-		
				day29~33		
				day36∼38		
	*					
Cet(アーピタックス)	アービタックス	500mg/m ²	2時間	day1	14日	_
			-1		+	
ビラフトビ/Cet	アービタックス	500mg/m ²	2時間	day1	14日	中/軽***
	ビラフトビ	300mg/日	1日1回 内服	毎日		
ビラフトビ/メクトビ/Cet	アービタックス	500mg/m ²	2時間	day1	14日	中/軽***
	ビラフトビ	300mg/日	1日1回 内服	毎日		
	メクトビ	90mg/日	1日2回 内服	毎日		
FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日	α/軽
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	day1-2		
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1—2 day1		Ī
	1 11 1 11 11	1 Joing/ III	50/1	ady i		Ī
EOLEIDI ZAFI	# # # トラップ	Ama/le=	1時間	dov1	140	0/ /起
FOLFIRI/AFL	ザルトラップ	4mg/kg	1時間	day1	14日	α/軽
	レボホリナート	200mg/m²	2時間	day1		Ī
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		Ī
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2		
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1		Ī
FOLFIRI/Bev(5)	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日	α/軽
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2		
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	30分(初回90分)	day1		
	. 412242	Jilig/ kg	30万 (利用90万)	dayı		
FOLETO: (O :	7 12557	E00 (m²	ort BB		440	/±⊽
FOLFIRI/Cet	アービタックス	500mg/m ²	2時間	day1	14日	α/軽
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2		
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1		
FOLFIRI / Pmab	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日	α/軽
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	day1-2		
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1		
	1 77 7 732	1 Johng/ III	3071	dayı		
FOLFIRI/RAM	サイラムザ	0/	30分(初回1時間)	day1	14日	α/軽
FOLFIRIZ RAM	1 424114 1	8mg/kg			141	u / ∓±
	レホホリナート	200mg/m²	2時間	dayı		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	day1-2		
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1		
mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日	α/軽☀
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2		Ī
	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	day1		I
				<u> </u>	1_	<u></u>
mFOLFOX6/Bev(5)	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日	α/軽∗
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		Ī
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	day1-2		Ī
	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	day1		Ī
	ベバシズマブ	5mg/kg	30分(初回90分)	day1		Ī
	.	- 3		-		Ī
mFOLFOX6/Cet	アービタックス	500mg/m ²	2時間	day1	14日	α/軽 *
	レボホリナート	200mg/m²	2時間	day1		l
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		Ī
						I
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	day1-2		Ī
	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	day1		Ī
FOLEOWS 45	* 5 = .1 * . 5 =	0 //	4.0+88		4	/±v -
mFOLFOX6 / Pmab	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日	α/軽∗
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1		I
	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		Ī
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2		Ī
	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	day1		Ī
		1		1		
				day1	14日	高/軽
mFOLFOXIRI	イリノテカン	150mg/m²	1時間			
mFOLFOXIRI						
mFOLFOXIRI	オキサリプラチン	85mg/ m i	2時間	day1		
mFOLFOXIRI	オキサリプラチン レボホリナート	85mg/m ² 200mg/m ²	2時間 2時間	day1 day1		
mFOLFOXIRI	オキサリプラチン	85mg/ m i	2時間	day1		
	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	85mg/m [*] 200mg/m [*] 2400mg/m [*]	2時間 2時間 46時間	day1 day1 day1 — 2		ᄒᄻ
mFOLFOXIRI mFOLFOXIRI/Bev	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル イリノテカン	85mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 150mg/m²	2時間 2時間 46時間 1時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	高/軽
	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル イリノテカン オキサリブラチン	85mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ² 150mg/m ² 85mg/m ²	2時間 2時間 46時間 1時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1 day1		高/軽
	オキサリブラチン レボホリナート フルオロウラシル イリノテカン オキサリブラチン レボホリナート	85mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 150mg/m² 85mg/m² 200mg/m²	2時間 2時間 46時間 1時間 2時間 2時間	day1 day1 - 2 day1 day1 day1 day1 day1		高/軽
	オキサリブラチン レボホリナート フルオロウラシル イリノテカン オキサリブラチン レボホリナート フルオロウラシル	85mg/m² 200mg/m² 2400mg/m³ 150mg/m³ 85mg/m³ 200mg/m² 2400mg/m³	2時間 2時間 46時間 1時間 2時間 2時間 46時間	day1 day1 - 2 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 - 2		高/軽
	オキサリブラチン レボホリナート フルオロウラシル イリノテカン オキサリブラチン レボホリナート	85mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 150mg/m² 85mg/m² 200mg/m²	2時間 2時間 46時間 1時間 2時間 2時間	day1 day1 - 2 day1 day1 day1 day1 day1		高/軽
mFOLFOXIRI/Bev	オキサリブラチン レボホリナート フルオロウラシル イリノテカン オキサリブラチン レボホリナート フルオロウラシル ベバシズマブ	85mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 150mg/m² 85mg/m² 200mg/m² 2400mg/m² 5mg/kg	2時間 2時間 46時間 1時間 2時間 2時間 46時間 30分(初回90分)	day1 day1 - 2 day1 - 2 day1 day1 day1 day1 - 2 day1	14日	
	オキサリブラチン レボホリナート フルオロウラシル イリノテカン オキサリブラチン レボホリナート フルオロウラシル	85mg/m² 200mg/m² 2400mg/m³ 150mg/m³ 85mg/m³ 200mg/m² 2400mg/m³	2時間 2時間 46時間 1時間 2時間 2時間 46時間	day1 day1 - 2 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 - 2		高/軽

19.20 メインダイブ Company membro) Company mem			•	•			
パージェク 200mc/tool 100分 100分 100分 100分 100分 100mc 100分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 100 100分	トラスツズマブ/Per	トラスツズマブ			day1	21日	-
RIB			(初回時 8mg/kg)	(90分)			
RTB		パージェタ	420mg/body	30分	day1		
PROBLEM			(初回時 840mg/body)	(60分)			
PROBLEM							
TRIS	IRIS	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~14	21日	α/軽
ロンサーフ		イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1		
ロンサーフ							
ペンダマブ 7.5 morks 20.9 (初間日の分) day1	IRIS/Bev	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~14	21日	α/軽
ロンサーフ ロンサーフ 3		イリノテカン	150mg/m ²	90分	day1		
*** 東京の日本書出し書かまた。		ベバシズマブ	7. 5mg/kg	30分(初回90分)	day1		
*** 東京の日本書出し書かまた。							
************************************	ロンサーフ	ロンサーフ	*3	1日2回 内服	day1~5. 8~12	28日	中
182日 月曜							
************************************	事前にBSAを算出し用量決定後に対	対応量のレジメンを選択して下さ	, ,				
************************************						_	
### 201-2014年後の書野子製造が表達の少さま聞している。 ### 201-2014年	ロンサーフ/Bev				=	28日	中/中/-
### CAPPUZ Pawe 1		·	5mg/kg	30分(初回90分)	day1. 15		
MMC/-6-FU フィトマイシン 10mg/m 24両所 day1 28日 報 7プラーボ 240mg/m day1 14日 - 1000mg/m 24両所 day1 28日 報 7プラーボ 240mg/body 30分 day1 28日 - 1000mg/m 250分 day1 21日 - 1000mg/m 2500 day1 21日 - 1000mg/m 2500 day1 21日 - 1000mg/m 2500 day1 25							
### 250mg/fmm 200mg/m 24時間 day1 44目	事前にBSAを算出し用量決定後に	材心量のレジメンを選択して下さ	› ` 				
### 250mg/fmm 200mg/m 24時間 day1 44目	MMC ZE—EU	フルマバン	10/m²	△問	da1	20 🗆	故又
#プジーボ					-	200	¥±
ABOmar/Loody	(UTI 1401)	ייים מולל מיים	1000ilig/111	241寸[日]	uay 1 · · · 4		
ABOmar/Loody		+=***_+	240/	204	41	140	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		オンノール	240ffig/ body	3071	uay i	144	
ASST-Vin-Name AT プラーボ	(MOI-LIRITE #6)						
ASST-Vin-Name AT プラーボ	オプジーボ(4温問問度)	オプジーボ	480mg/body	304	day1	28日	
# プレーボールーグ		3 / / 1		55/3	auy I	2011	
************************************	(ar Ingualization)						
************************************	オプジーボノヤーボイ	オプジーボ	240mg/hody	30分	dav1	21 Fl	_
# イトルーダ (MST-Hg/mgH)					-		
Prob (ペラテ(ビックス)	·····································] ' ''' '	g/ Ng	//	any i		
Prob (ペラテ(ビックス)							
Prob (ペラテ(ビックス)	キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/hody	30分	day1	21 Fl	_
Pmab (ペラテピッカス)		1					
aLV5FU2 レポポリナート フルオロウラシル 200mg/㎡ 2時間 day1 day1 カルオロウラシル 2400mg/㎡ 460時間 day1 カルオロウラシル 2400mg/㎡ 460時間 day1 カルオロウラシル 2400mg/㎡ 460時間 day1 カルオロウラシル 7ルオロウラシル 7. 5mg/kg 7. 5mg/	(1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 110						
aLV5FU2 レポポリナート フルオロウラシル 200mg/㎡ 2時間 day1 day1 カルオロウラシル 2400mg/㎡ 460時間 day1 カルオロウラシル 2400mg/㎡ 460時間 day1 カルオロウラシル 2400mg/㎡ 460時間 day1 カルオロウラシル 7ルオロウラシル 7. 5mg/kg 7. 5mg/	Pmab(ペクティピックス)	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14日	_
aLV6FU2/Bev(5)		,,,_,,,					
aLV5FU2/Bav(5)	sLV5FU2	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日	軽/軽
aLV5FU2/Bev(S) レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル フルオロウラシル スポインスマブ 46時間 day1 day1 day1 2400mg/mi 46時間 day1 day1 コルオロウラシル フルオロウラシル スティーガ スポーカート フルオロウラシル スティーガ スポーカート フルオロウラシル スケイピクス 60mg/mi 46時間 day1 2400mg/mi 2時間 day1 2400mg/mi 2時間 day1 2400mg/mi 26間 day1 25		フルオロウラシル			-		
プルオロウラシル 2400mg/mi 4698間 day1 da		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2		
プルオロウラシル 2400mg/mi 4698間 day1 da							
aLV5FU2/Cet	sLV5FU2/Bev(5)	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	day1	14日	軽/軽
aLV5FU2/Cet レポポリナート フレポロウラシル 400mg/㎡ 全開 day1 day1 14日 整/軽 doyn/m 240mg/㎡ 全開 day1 day1 2400mg/㎡ 2400mg/m 2400m		フルオロウラシル	400mg/m ²	全開	day1		
aLV6FU2/Cet レボホリナート フルオロウラシル 2400mg/㎡ 全開 day1 2400mg/㎡ 全開 day1 2400mg/㎡ と開間 day1 2400mg/㎡ は時間 day1 2400mg/㎡ はける day1 2400mg/㎡ は対しません day1 2400mg/㎡ と対間は対しません day1 2400mg/㎡ は対間は対しません day1 2400mg/㎡ と対間は day1 2400mg/㎡ と開間 day1 2400mg/㎡ は対しません day1 240		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	day1-2		
ADOME/mi		ベバシズマブ	5mg/kg	30分(初回90分)	day1		
ADOME/mi							
コルオロウラシル アービックス 240 0mg/ml 2時間	sLV5FU2/Cet	レボホリナート	200mg/m ²		day1	14日	軽/軽
マービタックス 500mg/m 2時間 day1 day1 14日 軽/軽 フルオロウラシル イクのmg/m 全開 day1 day1 day1 day1 day1 day1 イクラシル イクのmg/m 全開 day1 day1 day1 day1 イクティビックス 6mg/kg 1時間 day1 day1 day1 day1 イクティビックス 6mg/kg 1時間 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 イクティビックス 11日回 内服 day1		フルオロウラシル			-		
aLV5FU2/Pmab レボホリナート 200mg/㎡ 全開 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1					-		
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 会開 day1 day1 2 day1 4 day1 2 day1 4 day1 2 day1 2 day1 4 day1 2 day1 4 day1 2 day1 4 day1 2 day1 4 day1 4 day1 4 day1 2 day1 4 d		アービタックス	500mg/m²	2時間	day1		
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 会開 day1 day1 2 day1 4 day1 2 day1 4 day1 2 day1 2 day1 4 day1 2 day1 4 day1 2 day1 4 day1 2 day1 4 day1 4 day1 4 day1 2 day1 4 d				-1		_	
カルオロウラシル ペクテイピックス Gmg/kg	sLV5FU2 / Pmab				-	14日	軽/軽
スチパーガ スチパーガ 160mg/日 1日1回 内服 day1~21 28日 軽 SOX エスエーワン オキサリブラチン 130mg/㎡ 2時間 day1~14 day1 SOX/Bev エスエーワン *1 150mg/㎡ 2時間 day1~14 day1 21日 α/軽* *** *****************************			_		-		
Ref							
SOX		ヘクティヒックス	6mg/kg	一時间	dayı		
SOX	e .e	¬ 2 - 42	100 /日	4 D 4 D D D		00.0	±ν
オキサリブラチン 130mg/m 2時間 day1	ステハーカ	スナハーカ	I6Umg/ ⊟		day I ~ 2 I	28日	学 全
オキサリブラチン 130mg/m 2時間 day1	SOX	T7T—U',	*1	1日2回 内服	day1~14	21 🗆	α /蘇 •
SOX/Bev	301				-	210	ぴ / 宇笙 季
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		a ヤッソノフテノ	i SUrrig/ ITI	∠ ⊬寸 [日]	uay I		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	SOX /Bey	TスT—ロ`,	*1	1日2回 内服	day1~14	21日	α /蘇 ቈ
No. No	55,0 Dev				-	2111	u. / +I ▼
S-1 エスエーワン *1 1日2回 内服 day1~28 35日 軽 S-1/Bev エスエーワン *1 7.5mg/kg 30分 (初回90分) day1 21日 軽/軽 UFT UFT(UFT-E) *2 1日3回 内服 毎日 28日 軽 UFT/LV ホリナート 75mg/body 1日3回 8時間毎・食間 1日3回 8時間毎・食間 1日3回 8時間毎・食間 2日日 2日日 2日日 2日日 2日日 2日日 2日日 2日日 2日日 2日							
S-1/Bev				- 373 (MEIGON)			
S-1/Bev	S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	dav1~28	35⊟	軽
Vift		' '-		rink		221	
Vift	S-1/Bev	エスエーワン	*1	1日2回 内服	dav1~14	21日	軽/軽
UFT UFT(UFT-E) *2 1日3回 内服 毎日 28日 軽 UFT/LV ホリナート UFT(UFT-E) *2 1日3回 8時間毎・食間 day1~28 day1~28 CAPIRL/Bev カペシタビン イリノテカン 7.5 mg/kg 30分(初回90分) day1 day1 CAPOX カペシタビン オキサリブラチン 130 mg/㎡ 2時間 day1~14 day1 day1 CAPOX/Bev カペシタビン オキサリブラチン 130 mg/㎡ 2時間 day1~14 day1 day1 TFOLFOXIRI/Cet** オリノテカン 7.5 mg/kg 30分(初回90分) day1 1 21日 α/軽* TFOLFOXIRI/Cet** オリノテカン カペシタビン オキサリブラチン 130 mg/㎡ 2時間 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1	3,				-		
UFT / LV ポリナート		1	5.10		-		
UFT / LV ポリナート	UFT	UFT(UFT-E)	*2	1日3回 内服	毎日	28日	軽
VET (UFT - E) *2 1日3回 8時間毎・食間 day1~28							
VET (UFT - E) *2 1日3回 8時間毎・食間 day1~28	UFT/LV	ホリナート	75mg/body	1日3回 8時間毎·食間	day1~28	35日	軽
CAPIRI_/Bev					-		
CAPOX カペシタビン イキサリプラチン イキサリプラチン 130mg/m² 2時間 182回 内服 201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4							
CAPOX カペシタビン イキサリプラチン イキサリプラチン 130mg/m² 2時間 182回 内服 201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	CAPIRI/Bev	カペシタビン	E法 *E	1日2回 内服	day1~14	21日	α/ 軽
CAPOX		イリノテカン	200mg/m ²	90分	day1		
オキサリプラチン		ベバシズマブ	7. 5mg/kg	30分(初回90分)	day1		
オキサリプラチン	CAPOY	カペシタビン	C法 *C	1日2回 内服	day1~14	21日	α /軽 ★
CAPOX/Bev	OAF OA					Z : H	u. / +± ▼
##FOLFOXIRI/Cet** AT キサリプラチン							
ペパシズマブ 7. 5mg/kg 30分 (初回90分) day1 mFOLFOXIRI/ Cet** イリノテカン オキサリブラチン レポャリナート レポホリナート フルオロウラシル 150mg/m² 85mg/m² 200mg/m² 46時間 1時間 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1	CAPOX/Bev					21日	α/軽☀
mFOLFOXIRI/Cet**							
オキサリブラチン 85mg/㎡ 2時間 day1 レポホリナート 200mg/㎡ 2時間 day1 フルオロウラシル 2400mg/㎡ 46時間 day1ー2		ハンスマノ	/. Omg/kg	30万(柳凹90分)	uay i		
オキサリブラチン 85mg/㎡ 2時間 day1 レポホリナート 200mg/㎡ 2時間 day1 フルオロウラシル 2400mg/㎡ 46時間 day1ー2	mFOLFOXIRI/Cet * *	イリノテカン	150mg/m ²	1時間	day1	14日	高/軽
フルオロウラシル 2400mg/m 46時間 day1-2		オキサリプラチン	85mg/m²	2時間	day1		
ノーレラックへ SOOMB/III ZirjiBJ day I							
		<i>,</i> 一にダツクス	SOOmg/ M	∠呵囘	uay I		

^{*} 当院ではオキサリプラチン含有レジメンは中等度+オプション(α)の制吐療法を適用します
** 当院の委員会にて承認済み。医師の判断にて対象患者のみ使用可
** * * ガイドラインでは中等度催吐性リスクですが、当院では最小度催吐性リスクとして対応します