18 胆道癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
イミフィンジ (初回からの単独使用は不可)	イミフィンジ	1500mg/body ［体重30kg以下は20mg/kg］	1時間	day1	28日	−
GEM	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分	day1．8．15	28日	軽
GEM／CDDP	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/㎡ 25mg/㎡	30分 90分	day1．8 day1．8	21日	高
GEM／CDDP／イミフィンジ	ゲムシタビン シスプラチン イミフィンジ	1000mg/㎡ 25mg/㎡ 1500mg/body ［体重30kg以下は20mg/kg］	30分 90分 1時間	day1．8 day1．8 day1	21日	高/高
GEM／CDDP／キイトルーダ	ゲムシタビン シスプラチン キイトルーダ	1000mg/㎡ 25mg/㎡ 200mg/body	30分 90分 30分	day1．8 day1．8 day1	21日	高/高
GEM／CDDP／S－1	ゲムシタビン シスプラチン エスエーワン	1000mg/㎡ 25mg/㎡ *1	30分 90分 1日2回　内服	day1 day1 day1～7	14日	高/軽
GEM／キイトルーダ	ゲムシタビン キイトルーダ	1000mg/㎡ 200mg/body	30分 30分	day1．8 day1	21日	軽/軽
S－1	エスエーワン	*1	1日2回　内服	day1～28	35日	軽
S－1／GEM	エスエーワン ゲムシタビン	*1 1000mg/㎡	1日2回　内服 30分	day1～14 day1．8	21日	軽/軽