

# 18 胆道癌化学療法レジメン

| 療法名                       | 薬剤名                        | 投与量   | 投与時間                  | 施行日                        | 1クール | 催吐リスク |
|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|------|-------|
| デュルバルマブ<br>(初回からの単独使用は不可) | イミフィンジ                     | 1500mg/body<br>[体重30kg以下は20mg/kg]   | 1時間                   | day1                       | 28日  | -     |
| GEM                       | ゲムシタビン                     | 1000mg/m <sup>2</sup>   | 30分                   | day1. 8. 15                | 28日  | 軽     |
| GEM/CDDP                  | ゲムシタビン<br>シスプラチン           | 1000mg/m <sup>2</sup><br>25mg/m <sup>2</sup>                                      | 30分<br>90分            | day1. 8<br>day1. 8         | 21日  | 中     |
| GEM/CDDP/デュルバルマブ          | ゲムシタビン<br>シスプラチン<br>イミフィンジ | 1000mg/m <sup>2</sup><br>25mg/m <sup>2</sup><br>1500mg/body<br>[体重30kg以下は20mg/kg] | 30分<br>90分<br>1時間     | day1. 8<br>day1. 8<br>day1 | 21日  | 中/中   |
| GEM/CDDP/ペムプロリズマブ         | ゲムシタビン<br>シスプラチン<br>キイトルーダ | 1000mg/m <sup>2</sup><br>25mg/m <sup>2</sup><br>200mg/body                        | 30分<br>90分<br>30分     | day1. 8<br>day1. 8<br>day1 | 21日  | 中/中   |
| GEM/CDDP/S-1              | ゲムシタビン<br>シスプラチン<br>エスエーワン | 1000mg/m <sup>2</sup><br>25mg/m <sup>2</sup><br>*1                                | 30分<br>90分<br>1日2回 内服 | day1<br>day1<br>day1~7     | 14日  | 中/軽   |
| GEM/ペムプロリズマブ              | ゲムシタビン<br>キイトルーダ           | 1000mg/m <sup>2</sup><br>200mg/body   | 30分<br>30分            | day1. 8<br>day1            | 21日  | 軽/軽   |
| S-1/GEM                   | エスエーワン<br>ゲムシタビン           | *1<br>1000mg/m <sup>2</sup>   | 1日2回 内服<br>30分        | day1~14<br>day1. 8         | 21日  | 中/軽   |
| S-1                       | エスエーワン                     | *1  | 1日2回 内服               | day1~28                    | 42日  | 軽     |