

18 胆道癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
イミフィンジ (初回からの単独使用は不可)	イミフィンジ	1500mg/body [体重30kg以下は20mg/kg]	1時間	day1	28日	-
GEM	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1. 8. 15	28日	軽
GEM/CDDP	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ² 25mg/m ²	30分 90分	day1. 8 day1. 8	21日	高
GEM/CDDP/イミフィンジ	ゲムシタピン シスプラチン イミフィンジ	1000mg/m ² 25mg/m ² 1500mg/body [体重30kg以下は20mg/kg]	30分 90分 1時間	day1. 8 day1. 8 day1	21日	高/高
GEM/CDDP/S-1	ゲムシタピン シスプラチン エスエーワン	1000mg/m ² 25mg/m ² *1	30分 90分 1日2回 内服	day1 day1 day1~7	14日	高/軽
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1/GEM	エスエーワン ゲムシタピン	*1 1000mg/m ²	1日2回 内服 30分	day1~14 day1. 8	21日	軽/軽