

19 膵癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
FOLFIRI	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 180mg/m ²	2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
FOLFIRINOX	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン イリノテカン	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ² 180mg/m ²	2時間 全開 46時間 2時間 90分	day1 day1 day1-2 day1 day1	14日	高/軽
mFOLFIRINOX	レボホリナート フルオロウラシル オキサリプラチン イリノテカン	200mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ² 150mg/m ²	2時間 46時間 2時間 90分	day1 day1-2 day1 day1	14日	高/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 85mg/m ²	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1. 8. 15	28日	軽
GEM/ab-PTX	ゲムシタビン アブラキサン	1000mg/m ² 125mg/m ²	30分 30分	day1. 8. 15 day1. 8. 15	28日	中
GEM/タルセバ	ゲムシタビン タルセバ	1000mg/m ² 100mg/日	30分 1日1回 食間	day1. 8. 15 毎日	28日	軽/-
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1/GEM	エスエーワン ゲムシタビン	*1 1000mg/m ²	1日2回 内服 30分	day1~14 day1. 8	21日	軽/軽