

## 19 膵癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
FOLFIRI	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 180mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 90分	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
FOLFIRINOX	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル イリノテカン オキサリプラチン	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 180mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 90分 2時間	day1 day1 day1-2 day1 day1	14日	高/軽
mFOLFIRINOX	レボホリナート フルオロウラシル イリノテカン オキサリプラチン	200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 46時間 90分 2時間	day1 day1-2 day1 day1	14日	高/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1. 8. 15	28日	軽
GEM/ab-PTX	ゲムシタビン アブラキサン	1000mg/m <sup>2</sup> 125mg/m <sup>2</sup>	30分 30分	day1. 8. 15 day1. 8. 15	28日	中
GEM/タルセバ	ゲムシタビン タルセバ	1000mg/m <sup>2</sup> 100mg/日	30分 1日1回 食間	day1. 8. 15 毎日	28日	軽/-
na-IRI/5-FU/LV	オニパイド フルオロウラシル レボホリナート	70mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup>	90分 46時間 2時間	day1 day1-2 day1	14日	中/軽
リムパーザ	リムパーザ	600mg/日	1日2回 内服	毎日	28日	軽
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1 (2投1休)	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
S-1/GEM	エスエーワン ゲムシタビン	*1 1000mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 30分	day1~14 day1. 8	21日	軽/軽