

20 卵巣・卵管・腹膜癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
Bev (初回からの単独使用は不可)	アバスチン	15mg/kg	30分	day1	21日	-
BEP (胚細胞腫瘍) (性索間質性腫瘍)	ブレオ ラステット シスプラチン	20mg/m ² (最大30mg/日) 100mg/m ² 20mg/m ²	全開 90分 2時間	day2. 9. 16 day1~5 day1~5	21日	高/高/-
CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1. 8. 15	28日	中
CDGP/CPT-11	アクブラ イリノテカン	80mg/m ² 60mg/m ²	90分 90分	day1 day1. 8. 15	28日	中/中
DOXIL	ドキシル	40mg/m ²	90分	day1	28日	軽
DOXIL/Bev	ドキシル アバスチン	40mg/m ² 15mg/kg	90分 30分 (初回90分)	day1 day1	28日	軽
DOXIL/CBDCA	ドキシル カルボプラチン	30mg/m ² AUC=5	90分 1時間	day1 day1	28日	α
DTX/CBDCA	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	day1 day1	21日	α
DTX/CBDCA/Bev	ドセタキセル カルボプラチン アバスチン	70mg/m ² AUC=5 15mg/kg	1時間 1時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	α
Biweekly DTX/CBDCA	ドセタキセル カルボプラチン	35mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	day1. 15 day1	28日	α/軽
GEM	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1. 8. 15	28日	軽
GEM/CBDCA	ゲムシタピン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC=4	30分 1時間	day1. 8 day1	21日	α/軽
GEM/CBDCA/Bev	ゲムシタピン カルボプラチン アバスチン	1000mg/m ² AUC=4 15mg/kg	30分 1時間 30分 (初回90分)	day1. 8 day1 day1	21日	α/軽
リムパーザ	リムパーザ	600mg/日	1日2回	毎日	28日	中
Weekly PTX/Bev	パクリタキセル アバスチン	80mg/m ² 15mg/kg	1時間 30分 (初回90分)	day1. 8. 15 day1	21日	軽
PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC=5	3時間 1時間	day1 day1	21日	α
PTX	パクリタキセル	70mg/m ²	1時間	day1. 8. 15	28日	軽
Weekly PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC=2	1時間 1時間	day1. 8. 15 day1. 8. 15	28日	中
Dose dense PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC=6	1時間 1時間	day1. 8. 15 day1	21日	α/軽
PTX/CBDCA/Bev	パクリタキセル カルボプラチン アバスチン	175mg/m ² AUC=5 15mg/kg	3時間 1時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	α
PTX/CDDP	パクリタキセル シスプラチン	175mg/m ² 50mg/m ²	3時間 2時間	day1 day1	21日	高
ハイカムチン	ハイカムチン	1. 5mg/m ²	30分	day1~5	21日	軽
ハイカムチン/Bev	ハイカムチン アバスチン	1. 25mg/m ² 15mg/kg	30分 30分 (初回90分)	day1~5 day1	21日	軽
VP-16	ラステットS	50mg/body	1日1回 内服	day1~21	28日	中
DOXIL(臨床試験)	ドキシル	50mg/m ²	90分	day1	28日	軽