

22 子宮体癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
DTX/CBDCA	ドセタキセル カルボプラチン	60mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	day1 day1	21日	α
DTX/CBDCA/デュルバルマブ (PTX不耐症例に対して使用可)	ドセタキセル カルボプラチン イミフィンジ	60mg/m ² AUC=5 1120mg/body	1時間 1時間 1時間	day1 day1 day1	21日	α
DTX/CBDCA/ペムプロリズマブ	ドセタキセル カルボプラチン キイトルーダ	60mg/m ² AUC=5 200mg/body	1時間 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
AP	ドキシソルビシン シスプラチン	60mg/m ² 50mg/m ²	全開 2時間	day1 day1	28日	高
デュルバルマブ (初回からの単独使用は不可)	イミフィンジ	1500mg/body [体重30kg以下は20mg/kg]	1時間	day1	28日	-
レンパチニブ/ペムプロリズマブ	レンピマ キイトルーダ	20mg/日 200mg/body	1日1回 内服 30分	毎日 day1	21日	中/中
デュルバルマブ/オラパリブ (デュルバルマブ併用化学療法後に 使用可)	リムパーザ イミフィンジ	600mg/日 1500mg/body [体重30kg以下は20mg/kg]	1日2回 内服 1時間	毎日 day1	28日	中/中
PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC=5	3時間 1時間	day1 day1	21日	α
Weekly PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC=2	1時間 1時間	day1. 8. 15 day1. 8. 15	28日	中
PTX/CBDCA/デュルバルマブ	パクリタキセル カルボプラチン イミフィンジ	175mg/m ² AUC=5 1120mg/body	3時間 1時間 1時間	day1 day1 day1	21日	α
PTX/CBDCA/ペムプロリズマブ	パクリタキセル カルボプラチン キイトルーダ	175mg/m ² AUC=5 200mg/body	3時間 1時間 30分	day1 day1 day1	21日	α
ペムプロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	-
ペムプロリズマブ(6週間間隔) (初回からの単独使用は不可)	キイトルーダ	400mg/body	30分	day1	42日	-