

22 子宮体癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
AP	ドキシソビシン シスプラチン	60mg/m ² 50mg/m ²	全開 2時間	day1 day1	28日	高
DTX/CBDCA	ワンタキソテール カルボプラチン	70mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	day1 day1	28日	α
Biweekly DTX/CBDCA	ワンタキソテール カルボプラチン	35mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	day1. 15 day1	28日	α / 軽
GEM/DTX (子宮肉腫)	ジェムザール ワンタキソテール	900mg/m ² 70mg/m ²	30分 1時間	day1. 8 day8	21日	軽/軽
IP (子宮肉腫)	イホマイド シスプラチン	1500mg/m ² 20mg/m ²	30分 2時間	day1~4 day1~4	21日	高
	ウロミテキサン	400mg/回	静注	day1~4、1日3回 (IFM投与の直前・4h後・8h後に投与)		
PTX	パクリタキセル	70mg/m ²	1時間	day1. 8. 15	28日	軽
PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC=5	3時間 1時間	day1 day1	21日	α
Weekly PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC=2	1時間 1時間	day1. 8. 15 day1. 8. 15	28日	中
TI (子宮肉腫)	テラルビシン イホマイド	40mg/m ² 1500mg/m ²	全開 30分	day1 day1~4	21日	α / α
	ウロミテキサン	400mg/回	静注	day1~4、1日3回 (IFM投与の直前・4h後・8h後に投与)		