

23 絨毛性疾患化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
ACT-D	コスメゲン	0.5mg/body	全開	day1~5	14日	中
EMA/CO	ラステット メソトレキセート コスメゲン	100mg/m ² 300mg/m ² 0.5mg/body	90分 12時間 全開	day1. 2 day1 day1. 2	14日	高/中/中
	エンドキサン オンコピン ロイコボリン	600mg/m ² 1.0mg/m ² 15mg/回	30分 全開 筋注	day8 day8 メソトレキセート終了12h後より 12h毎に4回投与		
EP/EMA	ラステット シスプラチン	150mg/m ² 75mg/m ²	90分 2時間	day1 day1	14日	高/高
	ラステット メソトレキセート コスメゲン ロイコボリン	100mg/m ² 300mg/m ² 0.5mg/body 15mg/回	90分 12時間 全開 筋注	day8 day8 day8 メソトレキセート終了12h後より 12h毎に4回投与		
FA	フルオロウラシル コスメゲン	1500mg/body 0.5mg/body	8時間 全開	day1~5 day1~5	14日	中
MTX/LV (侵入奇胎) (存続絨毛症)	メソトレキセート	1mg/kg	筋注	day1. 3. 5. 7	14日	-
	ロイコボリン	7.5mg/日	1日1回 内服	day2. 4. 6. 8		
TP/TE	パクリタキセル	135mg/m ²	3時間	day1. 15	28日	高/軽
	シスプラチン	60mg/m ²	2時間	day1		
	ラステット	150mg/m ²	90分	day15		