

## 23 絨毛性疾患化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
ACT-D	コスメゲン	0. 5mg/body	全開	day1~5	14日	中
FA	フルオロウラシル コスメゲン	1500mg/body 0. 5mg/body	8時間 全開	day1~5 day1~5	14日	中
MTX/LV (侵入奇胎) (存続絨毛症)	メソトレキセート ロイコボリン	1mg/kg 7. 5mg/日	筋注 1日1回 内服	day1. 3. 5. 7 day2. 4. 6. 8	14日	-
EP/EMA	ラステット シスプラチン ラステット メソトレキセート コスメゲン ロイコボリン	150mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup> 300mg/m <sup>2</sup> 0. 5mg/body 15mg/回	90分 2時間 90分 12時間 全開 筋注	day1 day1 day8 day8 day8 メソトレキセート終了12h後より 12h毎に4回投与	14日	高/中
EMA/CO	ラステット メソトレキセート コスメゲン エンドキサン オンコピン ロイコボリン	100mg/m <sup>2</sup> 300mg/m <sup>2</sup> 0. 5mg/body 600mg/m <sup>2</sup> 1. 0mg/m <sup>2</sup> 15mg/回	90分 12時間 全開 30分 全開 筋注	day1. 2 day1 day1. 2 day8 day8 メソトレキセート終了12h後より 12h毎に4回投与	14日	高/中/中
TP/TE	パクリタキセル シスプラチン ラステット	135mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	3時間 2時間 90分	day1. 15 day1 day15	28日	高/軽