

25 脳腫瘍化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
ギリアデル (悪性神経膠腫)	ギリアデル	~8枚/回	術中脳内留置	day 1	14日	—
TMZ (悪性神経膠腫)	テモゾロミド	150mg/m ²	1日1回 内服	day 1~5	28日	中
TMZ(増量版) (悪性神経膠腫) *2クール目より使用可	テモゾロミド	200mg/m ²	1日1回 内服	day 1~5	28日	中
Weekly TMZ(再発) (悪性神経膠腫)	テモゾロミド	150mg/m ²	1日1回 内服	day1~7. 15~21	28日	中
TMZ(RTx併用時) (悪性神経膠腫)	テモゾロミド	75mg/m ²	1日1回 内服 (RTx1~2時間前に服用)	day1~42(放射線中断時49日まで延長可)	テモゾロミド終了から 4週間休薬する	中
TMZ/Bev(RTx併用時) (悪性神経膠腫)	テモゾロミド アバステン	75mg/m ² 10mg/kg	1日1回 内服 (RTx1~2時間前に服用) 30分(初回90分)	day1~42(放射線中断時49日まで延長可) day1. 15. 29. 42	テモゾロミド終了から 4週間休薬する	中/—
TMZ/Bev (悪性神経膠腫)	テモゾロミド アバステン	150mg/m ² 10mg/kg	1日1回 内服 30分(初回90分)	day1~5 day1. 15	28日	中/—
TMZ(増量版)/Bev (悪性神経膠腫) *2クール目より使用可	テモゾロミド アバステン	200mg/m ² 10mg/kg	1日1回 内服 30分(初回90分)	day 1~5 day1. 15	28日	中/—
Bev (悪性神経膠腫)	アバステン	15mg/kg	30分(初回90分)	day 1	21日	中