

25 脳腫瘍化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
Bmab	ペバシズマブ	15mg/kg	30分（初回90分）	day 1	21日	—
ギリアデル	ギリアデル	～8枚/回	術中脳内留置	day 1	14日	—
テモゾロミド	テモゾロミド	150mg/m ² (2コース目より200mg/m ² まで増量可)	1日1回 内服	day 1～5	28日	中
テモゾロミド(RTx併用時)	テモゾロミド	75mg/m ²	1日1回 内服 (RTx1～2時間前に服用)	day1～42(放射線中断時49日まで延長可)	テモゾロミド終了から 4週間休薬する	中
テモゾロミド/Bmab	テモゾロミド ペバシズマブ	150mg/m ² (2コース目より200mg/m ² まで増量可) 10mg/kg	1日1回 内服 30分（初回90分）	day1～5 day1. 15	28日	中/—
テモゾロミド/Bmab(RTx併用時)	テモゾロミド ペバシズマブ	75mg/m ² 10mg/kg	1日1回 内服 (RTx1～2時間前に服用) 30分（初回90分）	day1～42(放射線中断時49日まで延長可) day1. 15. 29. 42	テモゾロミド終了から 4週間休薬する	中/中