25 脳腫瘍化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1ｸｰﾙ	催吐ﾘｽｸ
ギリアデル （悪性神経膠腫）	ギリアデル	～8枚/回	術中脳内留置	day 1	14日	ー
TMZ （悪性神経膠腫）	テモゾロミド	150mg/㎡	1日1回　内服	day 1～5	28日	中
TMZ（増量版） （悪性神経膠腫） ＊2クール目より使用可	テモゾロミド	200mg/㎡	1日1回　内服	day 1～5	28日	中
TMZ/Bev （悪性神経膠腫）	テモゾロミド ベバシズマブ	150mg/㎡ 10mg/kg	1日1回　内服 30分（初回90分）	day1～5 day1．15	28日	中/ー
TMZ（増量版）/Bev （悪性神経膠腫） ＊2クール目より使用可	テモゾロミド ベバシズマブ	200mg/㎡ 10mg/kg	1日1回　内服 30分（初回90分）	day 1～5 day1．15	28日	中/ー
Bev （悪性神経膠腫）	ベバシズマブ	15mg/kg	30分（初回90分）	day 1	21日	ー
TMZ（RTx併用時） （悪性神経膠腫）	テモゾロミド	75mg/㎡	1日1回　内服 （RTx1～2時間前に服用）	day1～42（放射線中断時49日まで延長可）	テモゾロミド終了から 4週間休薬する	中
TMZ/Bev（RTx併用時） （悪性神経膠腫）	テモゾロミド ベバシズマブ	75mg/㎡ 10mg/kg	1日1回　内服 （RTx1～2時間前に服用） 30分（初回90分）	day1～42（放射線中断時49日まで延長可） day1．15．29．42	テモゾロミド終了から 4週間休薬する	中/ー