

26 頭頸部癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
CBDCA/5-FU/Cet	フルオロウラシル カルボプラチン アービタックス	1000mg/m ² AUC=5 250mg/m ² (初回時 400mg/m ²)	24時間 1時間 1時間 (2時間)	day1~4 day1 day1. 8. 15	21日	α/軽/-
CDDP (RTx併用時)	シスプラチン	100mg/m ²	2時間	day1	21日	高
Weekly Cet (RTx併用時)	アービタックス	250mg/m ² (初回時 400mg/m ²)	1時間 (2時間)	day1	7日	-
Biweekly Cet (RTx併用時の使用は不可)	アービタックス	500mg/m ²	2時間	day1	14日	-
FP	フルオロウラシル シスプラチン	1000mg/m ² 100mg/m ²	24時間 2時間	day1~4 day1	21日	高/軽
FP/Cet	フルオロウラシル シスプラチン アービタックス	1000mg/m ² 100mg/m ² 250mg/m ² (初回時 400mg/m ²)	24時間 2時間 1時間 (2時間)	day1~4 day1 day1. 8. 15	21日	高/軽/-
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	-
PTX	パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	day1. 8. 15. 22. 29. 36	49日	軽
PTX/Cet	パクリタキセル アービタックス	80mg/m ² 250mg/m ² (初回時 400mg/m ²)	1時間 1時間 (2時間)	day1 day1	7日	軽
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1 (RTx併用時)	エスエーワン	65mg/m ²	1日2回 内服	day1~28	35日	軽