

## 27 軟部腫瘍化学療法レジメン

| 療法名     | 薬剤名              | 投与量  | 投与時間       | 施行日                                  | 1クール | 催吐リスク |
|---------|------------------|--|------------|--------------------------------------|------|-------|
| DXR     | ドキシソルビシン         | 75mg/m <sup>2</sup>                          | 全開         | day1                                 | 21日  | 高     |
| エリブリン   | ハラヴェン            | 1.4mg/m <sup>2</sup>                         | 全開         | day1. 8                              | 21日  | 軽     |
| GEM/DTX | ゲムシタビン<br>ドセタキセル | 900mg/m <sup>2</sup><br>70mg/m <sup>2</sup>  | 30分<br>1時間 | day1. 8<br>day8                      | 21日  | 軽/軽   |
| IFM     | イホマイド            | 3000mg/m <sup>2</sup>                        | 3時間        | day1~3                               | 21日  | 高     |
| IP      | イホマイド<br>シスプラチン  | 1500mg/m <sup>2</sup><br>20mg/m <sup>2</sup> | 30分<br>2時間 | day1~4<br>day1~4                     | 21日  | 高     |
|         | ウロミテキサン          | 400mg/回                                      | 全開         | day1~4、1日3回<br>(IFM投与の直前・4h後・8h後に投与) |      |       |
| PTX     | パクリタキセル          | 80mg/m <sup>2</sup>                          | 1時間        | day1. 8. 15                          | 28日  | 軽     |
| パゾパニブ   | ヴオトリセント          | 800mg/日                                      | 1日1回 食間    | 毎日                                   | -    | 軽     |
| TI      | テラルビシン<br>イホマイド  | 40mg/m <sup>2</sup><br>1500mg/m <sup>2</sup> | 全開<br>30分  | day1<br>day1~4                       | 21日  | α/α   |
|         | ウロミテキサン          | 400mg/回                                      | 全開         | day1~4、1日3回<br>(IFM投与の直前・4h後・8h後に投与) |      |       |
| トラベクテジン | ヨンデリス            | 1.2mg/m <sup>2</sup>                         | 24時間       | day1                                 | 21日  | 中     |