

29 悪性リンパ腫化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
アレクテニブ (ALGL)	アレセンサ	600mg/日	1日2回 内服	毎日	-	軽
ベンダムスチン(90mg/m ²) ☆	ベンダムスチン	90mg/m ²	1時間	day1. 2	28日	中
ベンダムスチン(120mg/m ²) ☆	ベンダムスチン	120mg/m ²	1時間	day1. 2	21日	中
G-B (濾胞性リンパ腫)	ガザイバ ベンダムスチン	1000mg/body 90mg/m ²	4時間 1時間	day1 (1コース目のみ: day1. 8. 15) day1. 2	28日	中/中 (中/中/-)
Pola-BR	リツキシマブ ボライビー ベンダムスチン	375mg/m ² 1. 8mg/kg 90mg/m ²	4時間 30分 (初回90分) 1時間	day1 day1 (1コース目のみ: day2) day1. 2 (1コース目のみ: day2. 3)	21日	中/中 (-/中/中)
ブレutzキシマブ ベドチン	アドセトリス	1. 8mg/kg	30分	day1	21日	軽
DHAP ☆ (非ホジキンリンパ腫)	シスプラチン キロサイド デカドロン	100mg/m ² 2000mg/m ² /回 × 2 (4000mg/m ² /日) 40mg/日	24時間 3時間/回 ・12時間毎 1日1回 内服	day1 day2 day1~4	21日	高/中
DRC (原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫)	リツキシマブ エンドキサン デカドロン	375mg/m ² 200mg/m ² 20mg/日	4時間 1日2回 内服 1日1回 内服	day1 day1~5 day1	21日	中/中
HDAC	キロサイド	2000mg/m ²	3時間	day1. 2	28日	中
CHASE ☆ (非ホジキンリンパ腫) (ホジキンリンパ腫) (ATLL)	エンドキサン キロサイド ラステット デキサート	1200mg/m ² 2000mg/m ² 100mg/m ² 40mg/body	2時間 3時間 90分 30分	day1 day2. 3 day1~3 day1~3	21日	中/中
V-CAP ☆ (マントリン細胞リンパ腫)	ボルテゾミブ エンドキサン ドキシルピシン ブレドニン	1. 3mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 100mg/日	全開、または皮下注 2時間 全開 1日1~2回 内服	day1. 4. 8. 11 day1 day1 day1~5	21日	高/軽
A+CHP (T細胞性リンパ腫)	アドセトリス エンドキサン ドキシルピシン ブレドニン	1. 8mg/kg 750mg/m ² 50mg/m ² 100mg/日	30分 2時間 全開 1日1~2回 内服	day1 day1 day1 day1~5	21日	高/-
Pola-R-CHP	リツキシマブ ボライビー エンドキサン ドキシルピシン ブレドニン	375mg/m ² 1. 8mg/kg 750mg/m ² 50mg/m ² 100mg/日	4時間 30分 (初回90分) 2時間 全開 1日1~2回 内服 (day1は点滴: 30分)	day1 day1 day1 day1 day1~5	21日	高/-
エブコリタマブ (非ホジキンリンパ腫)	エブキンリ	48mg/body (1コース目・再導入day1は0. 16mg/body、day8は0. 8mg/body)	皮下注	day1. 8. 15. 22 (4コース目以降: day1. 15) (10コース目以降: day1)	28日	-
EPT A	ラステットS	200mg/日	1日1回 内服	day1~5	26日	軽
EPT B	ラステットS	50mg/日	1日1回 内服	day1~21	28日	軽
フォロデシン	ムンデシン	600mg/日	1日2回 内服	毎日	-	-
GCD ☆	ゲムシタピン カルボプラチン デカドロン	1000mg/m ² AUC=5 40mg/日	30分 1時間 1日1回 内服	day1. 8 day1 day1~4	21日	α/-/軽
GCDR	リツキシマブ ゲムシタピン カルボプラチン デカドロン	375mg/m ² 1000mg/m ² AUC=5 40mg/日	4時間 30分 1時間 1日1回 内服	day8 day1. 8 day1 day1~4	21日	α/-/軽
GDP ☆	ゲムシタピン シスプラチン デカドロン	1000mg/m ² 75mg/m ² 40mg/日	30分 2時間 (short hydration時は60分) 1日1回 内服	day1. 8 day1 day1~4	21日	高/-/軽
GDPR	リツキシマブ ゲムシタピン シスプラチン デカドロン	375mg/m ² 1000mg/m ² 75mg/m ² 40mg/日	4時間 30分 2時間 (short hydration時は60分) 1日1回 内服	day8 day1. 8 day1 day1~4	21日	高/-/軽
イブルチニブ (マントリン細胞リンパ腫)	イムブルピカ	560mg/日	1日1回 内服	毎日	-	軽
イブルチニブ (小リンパ球性リンパ腫)	イムブルピカ	420mg/日	1日1回 内服	毎日	-	軽
DeVIC ☆ (非ホジキンリンパ腫)	イホマイド ラステット カルボプラチン デキサート	1500mg/m ² 100mg/m ² 300mg/m ² 40mg/日	2時間 2時間 1時間 30分	day1~3 day1~3 day1 day1~3	21日	中/中
2/3DeVIC (非ホジキンリンパ腫)	イホマイド ラステット カルボプラチン デキサート	1000mg/m ² 67mg/m ² 200mg/m ² 40mg/日	2時間 2時間 1時間 30分	day1~3 day1~3 day1 day1~3	21日	中/中
レナリドミド (ATLL)	レブラミド	25mg/日	1日1回 内服	毎日	-	軽
MTX大量療法 ☆	メソトレキセート ロイコボリン	3500mg/m ² 15mg/m ²	4時間 静注	day1 メソトレキセート投与開始24h後より6h毎に8回投与	14日	中
R-MA	リツキシマブ メソトレキセート キロサイド ソルメドロール ロイコボリン ★随注	375mg/m ² 1000mg/m ² (100mg/m ² +900mg/m ²) 2000mg/m ² /回 × 2 (4000mg/m ² /日) 50mg/回 × 2 (100mg/日) 15mg/回 *詳細は『局所療法レジメン』を参照	4時間 24時間 (1時間+23時間) 3時間/回 ・12時間毎 全開/回 ・12時間毎 静注	day2 day1 day2・3 day1~3 day2	14日	中/中/中
R-MPV	リツキシマブ メソトレキセート オンコピン プロカルバジン ロイコボリン ★随注	375mg/m ² 3500mg/m ² 1. 4mg/m ² (最大2mg) 100mg/m ² 15mg/m ² /回 *詳細は『局所療法レジメン』を参照	4時間 2時間 全開 1日1~3回 内服 静注	day1 day2 day2 day1~7 (奇数コースのみ) メソトレキセート開始24h後より6h毎に8回投与 day5~12の間に1回 (脳脊髄液細胞診陽性時)	14日	(奇数コース) 高/高/高 (偶数コース) -/中

モガムリズマブ	ボテリジオ	1mg/kg	2時間	day1	7日	軽
モガムリズマブ【併用版】★	ボテリジオ	1mg/kg *★印のあるレジメンとのみ併用可	2時間	day1	14日	軽
ニボルマブ (ホジキンリンパ腫)	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
オビヌツマブ (濾胞性リンパ腫)	ガザイバ	1000mg/body	4時間	day1	21日 (維持療法は2ヶ月毎に2年間)	-
ピルトブルチニブ (マントル細胞リンパ腫)	ジャイバーカ	200mg/日	1日1回 内服	毎日	-	-
ブララトレキサート	ジフォルタ	30mg/m ²	全開	day1・8・15・22・29・36	49日	-
リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m ²	4時間	day1	7日	-
リツキシマブ【併用版】☆	リツキシマブ	375mg/m ² *リツキシマブを含むレジメンもしくは★印のあるレジメンとのみ併用可 *リツキシマブ間の投与間隔:7日	4時間	day1	7日	-
R2 (濾胞性リンパ腫及び 辺縁帯リンパ腫)	リツキシマブ レブラミド	375mg/m ² 20mg/日	4時間 1日1回 内服	day1. 8. 15. 22 (2~5コース目:day1) (6コース目以降:なし) day1~day21	28日	軽/軽/- (軽/軽) (軽)
ロミデプシン (末梢性T細胞リンパ腫)	イストダックス	14mg/m ²	4時間	day1. 8. 15	28日	中
テラブルチニブ (中枢神経系原発リンパ腫) 胞リンパ腫)	ベレキシブル	480mg/日	1日1回 食間	毎日	-	-
ツジジノスタット (ATLL) (末梢性T細胞リンパ腫)	ハイヤスタ	40mg/日	1日1回 内服	1週間に2回	-	-
パレメスタット (ATLL)	エザルミア	200mg/日	1日1回 食間	毎日	-	-
ABVd (ホジキンリンパ腫)	ドキシルビシン ブレオ エクザール ダカルバジン	25mg/m ² 9mg/m ² (最大15mg) 6mg/m ² (最大10mg) 250mg/m ²	30分 30分 全開 30分	day1. 15 day1. 15 day1. 15 day1. 15	28日	高
ABVD (ホジキンリンパ腫)	ドキシルビシン ブレオ エクザール ダカルバジン	25mg/m ² 9mg/m ² (最大15mg) 6mg/m ² (最大10mg) 375mg/m ²	30分 30分 全開 30分	day1. 15 day1. 15 day1. 15 day1. 15	28日	高
A+AVD (ホジキンリンパ腫)	アドセトリス ドキシルビシン エクザール ダカルバジン	1. 2mg/kg 25mg/m ² 6mg/m ² (最大10mg) 375mg/m ²	30分 30分 全開 30分	day1. 15 day1. 15 day1. 15 day1. 15	28日	高
CHOP ☆★ (非ホジキンリンパ腫) (ATLL)	エンドキサン ドキシルビシン オンコピン ブレドニン	750mg/m ² 50mg/m ² 1. 4mg/m ² (最大2mg) 100mg/日	2時間 全開 全開 1日1~2回 内服	day1 day1 day1 day1~5	21日	高/-
maxi-CHOP (Nordic) ☆ (マントル細胞リンパ腫)	エンドキサン ドキシルビシン オンコピン ブレドニン	1200mg/m ² 75mg/m ² 2mg/body 100mg/日	2時間 全開 全開 1日1~2回 内服	day1 day1 day1 day1~5	21日	高/-
HDAC (Nordic) ☆ (マントル細胞リンパ腫)	キロサイド	3000mg/m ² /回 × 2 (6000mg/m ² /日) ※60歳以上は2000mg/m ² /回 × 2 (4000mg/m ² /日)	3時間/回・12時間毎	day1. 2	21日	中
DA-EPOCH-R (非ホジキンリンパ腫)	リツキシマブ ドキシルビシン オンコピン ラステット エンドキサン ブレドニン	375mg/m ² 10mg/m ² 0. 4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 120mg/m ²	4時間 24時間 24時間 24時間 2時間 1日2回 内服	day1 day1~4 day1~4 day1~4 day5 day1~5	21日	高/高/中
★随注	day1.5(第3サイクル~第6サイクル)(Burkitt lymphomaで脳脊髄液細胞診・細胞表面抗原 陰性 の場合) (primary mediastinal B-cell lymphomaで、2つ以上の節外病変が存在し、LDHが上昇している場合) 第1サイクルday1から1週間に2回を4週間+1週間に1回を6週間+1ヶ月に1回を4ヶ月 (Burkitt lymphomaで脳脊髄液細胞診・細胞表面抗原 陽性 の場合) *詳細は『局所療法レジメン』を参照					
DA-EPOCH-R (増量版) (Level 2・3・4) (非ホジキンリンパ腫) *Level毎に用量が異なります	リツキシマブ ドキシルビシン* オンコピン ラステット* エンドキサン* ブレドニン	375mg/m ² Level 2(12mg/m ²), Level 3(14. 4mg/m ²), Level 4(17. 3mg/m ²) 0. 4mg/m ² Level 2(60mg/m ²), Level 3(72mg/m ²), Level 4(86. 4mg/m ²) Level 2(900mg/m ²), Level 3(1080mg/m ²), Level 4(1296mg/m ²) 120mg/m ²	4時間 24時間 24時間 24時間 2時間 1日2回 内服	day1 day1~4 day1~4 day1~4 day5 day1~5	21日	高/高/中
★随注	day1.5(第3サイクル~第6サイクル)(Burkitt lymphomaで脳脊髄液細胞診・細胞表面抗原 陰性 の場合) (primary mediastinal B-cell lymphomaで、2つ以上の節外病変が存在し、LDHが上昇している場合) 第1サイクルday1から1週間に2回を4週間+1週間に1回を6週間+1ヶ月に1回を4ヶ月 (Burkitt lymphomaで脳脊髄液細胞診・細胞表面抗原 陽性 の場合) *詳細は『局所療法レジメン』を参照					
CHOP-V-MMV (ATLL)	エンドキサン ドキシルビシン オンコピン ラステット サイメリン ノバントロン フィルデシン ブレドニン	400mg/m ² 40mg/m ² 1mg/m ² (最大2mg) 35mg/m ² 60mg/m ² 7mg/m ² 2mg/m ² 40mg/m ²	2時間 全開 全開 90分 全開 30分 全開	day1 day1 day1 day1~8 day8 day8 day8 day1~3. 8~10	21日	高/軽/中/-
G-CHOP (濾胞性リンパ腫)	ガザイバ エンドキサン ドキシルビシン オンコピン ブレドニン	1000mg/body 750mg/m ² 50mg/m ² 1. 4mg/m ² (最大2mg) 100mg/日	4時間 2時間 全開 全開 1日1回 内服 (day1は点滴・全開)	day1 (1コース目のみ:day1. 8. 15) day1 day1 day1 day1~5	21日	高/- (高/-/-)
R-CHOP (非ホジキンリンパ腫)	リツキシマブ エンドキサン ドキシルビシン オンコピン ブレドニン	375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 1. 4mg/m ² (最大2mg) 100mg/日	4時間 2時間 全開 全開 1日1~2回 内服	day1 day2 day2 day2 day2~6	21日	-/高/-
*1日版の場合、day1は水様性ブレドニン100mg/日 点滴:30分						
R-hyper-CVAD	リツキシマブ エンドキサン オンコピン ドキシルビシン デカドロン	375mg/m ² 300mg/m ² /回 × 2 2mg/body 50mg/m ² 40mg/日	4時間 2時間/回・12時間毎 全開 24時間 1日1回 内服	day1 day1~3 day4. day11 day4 day1~4. day11~14 day2	14日	高/高/中/-/-
★随注	*詳細は『局所療法レジメン』を参照					

mLSG15 ★ (ATLL)	VCAP オンコピン エンドキサン ドキシルビシン プレドニン	1mg/m ² (最大2mg) 350mg/m ² 40mg/m ² 40mg/m ²	全開 2時間 全開 1日1~2回 内服	day1 day1 day1 day1	28日	高
	AMP ドキシルビシン サイメリン プレドニン	30mg/m ² 60mg/m ² 40mg/m ²	全開 全開 1日1~2回 内服	day8 day8 day8		中
	VECP フィルデシン ラステット カルボプラチン プレドニン	2.4mg/m ² 100mg/m ² 250mg/m ² 40mg/m ²	全開 90分 1時間 1日1~2回 内服	day15 day15~17 day15 day15~17		中/軽
	★随注	1. 3. 5クルールの終了後(かつ次クール開始2日以上前までの間)に投与 *詳細は『局所療法レジメン』を参照				
THP-COP ★★ (非ホジキンリンパ腫) (ATLL)	エンドキサン テラルビシン オンコピン プレドニン	750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² (最大2mg) 100mg/日	2時間 全開 全開 1日1~2回 内服	day1 day1 day1 day1~5	21日	高/-
G-THP-COP (非ホジキンリンパ腫)	ガザイバ エンドキサン テラルビシン オンコピン プレドニン	1000mg/body 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² (最大2mg) 100mg/日 *1日版の場合、day1は水様性プレドニン	4時間 2時間 全開 全開 1日1~2回 内服 100mg/日 点滴:30分	day1 (1コース目のみ: day1. 8. 15) day2 day2 day2 day2~6	21日	高/- (高/-/-)
R-THP-COP (非ホジキンリンパ腫)	リツキシマブ エンドキサン テラルビシン オンコピン プレドニン	375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² (最大2mg) 100mg/日 *1日版の場合、day1は水様性プレドニン	4時間 2時間 全開 全開 1日1~2回 内服 100mg/日 点滴:30分	day1 day2 day2 day2 day2~6	21日	-/高/-