29 悪性リンパ腫化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
アレセンサ （ALCL）	アレセンサ	600mg/日	1日2回　内服	毎日	28日	軽
HDAC	キロサイド	2000mg/㎡	3時間	day1．2	28日	中
ABVd （ホジキンリンパ腫）	ドキソルビシン ブレオ エクザール ダカルバジン	25mg/㎡ 9mg/㎡（最大15mg） 6mg/㎡（最大10mg） 250mg/㎡	30分 30分 全開 30分	day1．15 day1．15 day1．15 day1．15	28日	高
ABVD （ホジキンリンパ腫）	ドキソルビシン ブレオ エクザール ダカルバジン	25mg/㎡ 9mg/㎡（最大15mg） 6mg/㎡（最大10mg） 375mg/㎡	30分 30分 全開 30分	day1．15 day1．15 day1．15 day1．15	28日	高
mLSG15 ★ （ATLL）					28日	
	VCAP オンコビン エンドキサン ドキソルビシン プレドニン	1mg/㎡（最大2mg） 350mg/㎡ 40mg/㎡ 40mg/㎡	全開 2時間 全開 1日1～2回　内服	day1 day1 day1 day1		高
	AMP ドキソルビシン サイメリン プレドニン	30mg/㎡ 60mg/㎡ 40mg/㎡	全開 全開 1日1～2回　内服	day8 day8 day8		中
	VECP フィルデシン ラステット カルボプラチン プレドニン	2．4mg/㎡ 100mg/㎡ 250mg/㎡ 40mg/㎡	全開 90分 1時間 1日1～2回　内服	day15 day15～17 day15 day15～17		中/軽
	★髄注	1．3．5クールの終了後（かつ次クール開始2日以上前までの間）に投与 ＊詳細は『局所療法レジメン』を参照				
ベンダムスチン（90mg/㎡）★	ベンダムスチン	90mg/㎡	1時間	day1．2	28日	中
ベンダムスチン（120mg/㎡）★	ベンダムスチン	120mg/㎡	1時間	day1．2	21日	中
G-B （濾胞性リンパ腫）	ガザイバ ベンダムスチン	1000mg/body 90mg/㎡	4時間 1時間	day1 （1コース目のみ：day1．8．15） day1．2	28日	中/中 （中/中/-）
Pola-BR	リツキシマブ ポライビー ベンダムスチン	375mg/㎡ 1．8mg/kg 90mg/㎡	4時間 30分（初回90分） 1時間	day1 day1 （1コース目のみ：day2） day1．2 （1コース目のみ：day2．3）	21日	中/中 （-/中/中）
アドセトリス	アドセトリス	1．8mg/kg	30分	day1	21日	軽
A+CHP （T細胞性リンパ腫）	アドセトリス エンドキサン ドキソルビシン プレドニン	1．8mg/kg 750mg/㎡ 50mg/㎡ 100mg/日	30分 2時間 全開 1日1～2回　内服	day1 day1 day1 day 1～5	21日	高/-
A+AVD （ホジキンリンパ腫）	アドセトリス ドキソルビシン エクザール ダカルバジン	1．2mg/kg 25mg/㎡ 6mg/㎡（最大10mg） 375mg/㎡	30分 30分 全開 30分	day1．15 day1．15 day1．15 day1．15	28日	高
CHASE ★ （非ホジキンリンパ腫） （ホジキンリンパ腫） （ATLL）	エンドキサン キロサイド ラステット デキサート	1200mg/㎡ 2000mg/㎡ 100mg/㎡ 40mg/body	2時間 3時間 90分 30分	day1 day2．3 day1～3 day1～3	21日	α/中
CHASER （非ホジキンリンパ腫）	リツキシマブ エンドキサン キロサイド ラステット デキサート	375mg/㎡ 1200mg/㎡ 2000mg/㎡ 100mg/㎡ 40mg/body	4時間 2時間 3時間 90分 30分	day1 day2 day3．4 day2～4 day2～4	21日	-/α/中
Pola-R-CHP	リツキシマブ ポライビー エンドキサン ドキソルビシン プレドニン	375mg/㎡ 1．8mg/kg 750mg/㎡ 50mg/㎡ 100mg/日	4時間 30分（初回90分） 2時間 全開 1日1～2回　内服 （day1は点滴：30分）	day1 day1 day1 day1 day 1～5	21日	高/-
CHOP ★ （非ホジキンリンパ腫） （ATLL）	エンドキサン ドキソルビシン オンコビン プレドニン	750mg/㎡ 50mg/㎡ 1．4mg/㎡（最大2mg） 100mg/日	2時間 全開 全開 1日1～2回　内服	day1 day1 day1 day 1～5	21日	高/-
G-CHOP （濾胞性リンパ腫）	ガザイバ エンドキサン ドキソルビシン オンコビン プレドニン	1000mg/body 750mg/㎡ 50mg/㎡ 1．4mg/㎡（最大2mg） 100mg/日	4時間 2時間 全開 全開 1日1回　内服 （day1は点滴：全開）	day1 （1コース目のみ：day1．8．15） day1 day1 day1 day1～5	21日	高/- （高/-/-）
R-CHOP （非ホジキンリンパ腫）	リツキシマブ エンドキサン ドキソルビシン オンコビン プレドニン	375mg/㎡ 750mg/㎡ 50mg/㎡ 1．4mg/㎡（最大2mg） 100mg/日 *1日版の場合、day1は水様性プレドニン100mg/日　点滴：30分	4時間 2時間 全開 全開 1日1～2回　内服	day1 day2 day2 day2 day2～6	21日	-/高/-
CHOP-V-MMV （ATLL）	エンドキサン ドキソルビシン オンコビン ラステット サイメリン ノバントロン フィルデシン プレドニン	400mg/㎡ 40mg/㎡ 1mg/㎡（最大2mg） 35mg/㎡ 60mg/㎡ 7mg/㎡ 2mg/㎡ 40mg/㎡	2時間 全開 全開 90分 全開 30分 全開 1日1～2回　内服	day1 day1 day1 day1～8 day8 day8 day8 day 1～3．8～10	21日	高/軽/軽/中/-
THP-COP ★ （非ホジキンリンパ腫） （ATLL）	エンドキサン テラルビシン オンコビン プレドニン	750mg/㎡ 50mg/㎡ 1．4mg/㎡（最大2mg） 100mg/日	2時間 全開 全開 1日1～2回　内服	day1 day1 day1 day 1～5	21日	高/-
R-THP-COP （非ホジキンリンパ腫）	リツキシマブ エンドキサン テラルビシン オンコビン プレドニン	375mg/㎡ 750mg/㎡ 50mg/㎡ 1．4mg/㎡（最大2mg） 100mg/日 *1日版の場合、day1は水様性プレドニン100mg/日　点滴：30分	4時間 2時間 全開 全開 1日1～2回　内服	day1 day2 day2 day2 day2～6	21日	-/高/-

DaVIC ★ （非ホジキンリンパ腫）	イホマイド ラステット カルボプラチン デキサート	1500mg/㎡ 100mg/㎡ 300mg/㎡ 40mg/日	2時間 2時間 1時間 30分	day1～3 day1～3 day1 day1～3	21日	高/中
2/3DaVIC （非ホジキンリンパ腫）	イホマイド ラステット カルボプラチン デキサート	1000mg/㎡ 67mg/㎡ 200mg/㎡ 40mg/日	2時間 2時間 1時間 30分	day1～3 day1～3 day1 day1～3	21日	高/中
DA-EPOCH-R （非ホジキンリンパ腫）	リツキシマブ ドキソルビシン オンコビン ラステット エンドキサン プレドニン	375mg/㎡ 10mg/㎡ 0．4mg/㎡ 50mg/㎡ 750mg/㎡ 120mg/㎡	4時間 24時間 24時間 24時間 2時間 1日2回　内服	day1 day1～4 day1～4 day1～4 day5 day1～5	21日	高/高/中
	★髄注	day1,5（第3サイクル～第6サイクル）（Burkitt lymphomaで脳脊髄液細胞診・細胞表面抗原 陰性 の場合） （primary mediastinal B-cell lymphomaで、2つ以上の節外病変が存在し、LDHが上昇している場合） 第1サイクルday1から1週間に2回を4週間＋1週間に1回を6週間＋1ヶ月に1回を4ヶ月 （Burkitt lymphomaで脳脊髄液細胞診・細胞表面抗原 陽性 の場合） ＊詳細は『局所療法レジメン』を参照				
DA-EPOCH-R（増量版） **（Level 2・3・4）** （非ホジキンリンパ腫） **＊Level毎に用量が異なります**	リツキシマブ ドキソルビシン＊ オンコビン ラステット＊ エンドキサン＊ プレドニン	375mg/㎡ Level 2(12mg/㎡)、Level 3(14．4mg/㎡)、Level 4(17．3mg/㎡) 0．4mg/㎡ Level 2(60mg/㎡)、Level 3(72mg/㎡)、Level 4(86．4mg/㎡) Level 2(900mg/㎡)、Level 3(1080mg/㎡)、Level 4(1296mg/㎡) 120mg/㎡	4時間 24時間 24時間 24時間 2時間 1日2回　内服	day1 day1～4 day1～4 day1～4 day5 day1～5	21日	高/高/中
	★髄注	day1,5（第3サイクル～第6サイクル）（Burkitt lymphomaで脳脊髄液細胞診・細胞表面抗原 陰性 の場合） （primary mediastinal B-cell lymphomaで、2つ以上の節外病変が存在し、LDHが上昇している場合） 第1サイクルday1から1週間に2回を4週間＋1週間に1回を6週間＋1ヶ月に1回を4ヶ月 （Burkitt lymphomaで脳脊髄液細胞診・細胞表面抗原 陽性 の場合） ＊詳細は『局所療法レジメン』を参照				
エプキンリ （非ホジキンリンパ腫）	エプキンリ	48mg/body （1コース目・再導入day1は0．16mg/body、day8は0．8mg/body）	皮下注	day1．8．15．22 （4コース目以降：day1．15） （10コース目以降：day1）	28日	-
ムンデシン	ムンデシン	600mg/日	1日2回　内服	毎日	28日	-
GCD ★	ゲムシタビン カルボプラチン デカドロン	1000mg/㎡ AUC＝5 40mg/日	30分 1時間 1日1回　内服	day1．8 day1 day1～4	21日	α/-/軽
GCDR	リツキシマブ ゲムシタビン カルボプラチン デカドロン	375mg/㎡ 1000mg/㎡ AUC＝5 40mg/日	4時間 30分 1時間 1日1回　内服	day8 day1．8 day1 day1～4	21日	α/-/軽
GDP ★	ゲムシタビン シスプラチン デカドロン	1000mg/㎡ 75mg/㎡ 40mg/日	30分 2時間 （short hydration時は60分） 1日1回　内服	day1．8 day1 day1～4	21日	高/-/軽
GDPR	リツキシマブ ゲムシタビン シスプラチン デカドロン	375mg/㎡ 1000mg/㎡ 75mg/㎡ 40mg/日	4時間 30分 2時間 （short hydration時は60分） 1日1回　内服	day8 day1．8 day1 day1～4	21日	高/-/軽
R-hyper-CVAD	リツキシマブ エンドキサン オンコビン ドキソルビシン デカドロン	375mg/㎡ 300mg/㎡/回　×2 2mg/body 50mg/㎡ 40mg/日	4時間 2時間/回　・12時間毎 全開 24時間 1日1回　内服	day1 day1～3 day4．day11 day4 day1～4．day11～14	14日	高/高/中/-/-
	★髄注	＊詳細は『局所療法レジメン』を参照		day2		
R-MA	リツキシマブ メソトレキセート キロサイド ソルメドロール	375mg/㎡ 1000mg/㎡ （100mg/㎡＋900mg/㎡） 2000mg/㎡/回　×2 （4000mg/㎡/日） 50mg/回　×2 （100mg/日）	4時間 24時間 （1時間＋23時間） 3時間/回　・12時間毎 全開/回　・12時間毎	day2 day1 day2・3 day1～3	14日	中/中/中
	ロイコボリン	15mg/回	静注	メソトレキセート終了12h後より6h毎に8回投与		
	★髄注	＊詳細は『局所療法レジメン』を参照		day2		
イムブルビカ （マントル細胞リンパ腫）	イムブルビカ	560mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	軽
イムブルビカ （小リンパ球性リンパ腫）	イムブルビカ	420mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	軽
MTX大量療法☆	メソトレキセート ロイコボリン	3500mg/㎡ 15mg/㎡	4時間 静注	day1 メソトレキセート投与開始24h後より6h毎に8回投与	14日	α
R-MTX大量療法	リツキシマブ メソトレキセート ロイコボリン	375mg/㎡ 3500mg/㎡ 15mg/㎡	4時間 4時間 静注	day1 day2 メソトレキセート投与開始24h後より6h毎に8回投与	14日	-/α
R-MPV	リツキシマブ メソトレキセート オンコビン プロカルバジン ロイコボリン	375mg/㎡ 3500mg/㎡ 1．4mg/㎡（最大2mg） 100mg/㎡ 15mg/㎡/回	4時間 2時間 全開 1日1～3回　内服 静注	day1 day2 day2 day1～7（奇数コースのみ） メソトレキセート開始24h後より6h毎に8回投与	14日	（奇数コース） 高/高/高 （偶数コース） -/α
	★髄注	＊詳細は『局所療法レジメン』を参照		day5～12の間に1回（脳脊髄液細胞診陽性時）		
オブジーボ （ホジキンリンパ腫）	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
ガザイバ （濾胞性リンパ腫）	ガザイバ	1000mg/body	4時間	day1	21日 （維持療法は2ヶ月毎に2年間）	-
ポテリジオ	ポテリジオ	1mg/kg	2時間	day1	7日	軽
ポテリジオ【併用版】	ポテリジオ	1mg/kg ＊★印のあるレジメンとのみ併用可	2時間	day1	14日	軽
ジフォルタ	ジフォルタ	30mg/㎡	全開	day1・8・15・22・29・36	49日	軽
レブラミド （ATLL）	レブラミド	25mg/日	1日1回　内服	毎日	28日	軽
R2 （濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫）	リツキシマブ レブラミド	375mg/㎡ 20mg/日	4時間 1日1回　内服	day1．8．15．22 （2～5コース目：day1） （6コース目以降：なし） day1～day21	28日	軽/軽 （軽/軽） （軽）
リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/㎡	4時間	day1	7日	-
リツキシマブ【併用版】	リツキシマブ	375mg/㎡ ＊リツキシマブを含むレジメンもしくは☆印のあるレジメンとのみ併用可 ＊リツキシマブ間の投与間隔：7日	4時間	day1	7日	-
イストダックス （末梢性T細胞リンパ腫）	イストダックス	14mg/㎡	4時間	day1．8．15	28日	中

ベレキシブル (中枢神経系原発リンパ腫) (原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫)	ベレキシブル	480mg/日	1日1回　食間	毎日	28日	軽
ハイヤスタ (ATLL) (末梢性T細胞リンパ腫)	ハイヤスタ	40mg/日	1日1回　内服	1週間に2回	28日	軽
VR-CAP (マントル細胞リンパ腫)	ボルテゾミブ リツキシマブ エンドキサン ドキソルビシン プレドニン	1．3mg/㎡ 375mg/㎡ 750mg/㎡ 50mg/㎡ 100mg/日	全開、または皮下注 4時間 2時間 全開 1日1～2回　内服	day1．4．8．11 day1 day1 day1 day1～5	21日	高/-/-/-
V-CAP ☆ (マントル細胞リンパ腫)	ボルテゾミブ エンドキサン ドキソルビシン プレドニン	1．3mg/㎡ 750mg/㎡ 50mg/㎡ 100mg/日	全開、または皮下注 2時間 全開 1日1～2回　内服	day1．4．8．11 day1 day1 day1～5	21日	高/-/-/-
エザルミア (ATLL)	エザルミア	200mg/日	1日1回　食間	毎日	28日	軽
VP－16 A	ラステットS	200mg/日	1日1回　内服	day1～5	26日	軽
VP－16 B	ラステットS	50mg/日	1日1回　内服	day1～21	28日	軽