

29 悪性リンパ腫化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
HDAC	キロサイド	2000mg/m ²	3時間	day1. 2	28日	中
ABVd (ホジキンリンパ腫)	ドキシルビシン ブレオ エクザール ダカルバジン	25mg/m ² 9mg/m ² (最大15mg/日) 6mg/m ² (最大10mg/日) 250mg/m ²	30分 30分 全開 30分	day1. 15 day1. 15 day1. 15 day1. 15	28日	高
ABVD (ホジキンリンパ腫)	ドキシルビシン ブレオ エクザール ダカルバジン	25mg/m ² 9mg/m ² (最大15mg/日) 6mg/m ² (最大10mg/日) 375mg/m ²	30分 30分 全開 30分	day1. 15 day1. 15 day1. 15 day1. 15	28日	高
VCAP/AMP/VECP (ATLL)	VCAP オンコピン エンドキサン ドキシルビシン ブレドニン AMP ドキシルビシン サイメリン ブレドニン VECP フィルデシン ラステット カルボプラチン ブレドニン ★随注	1mg/m ² (最大2mg/日) 350mg/m ² 40mg/m ² 40mg/m ² 30mg/m ² 60mg/m ² 40mg/m ² 2.4mg/m ² 100mg/m ² 250mg/m ² 40mg/m ²	全開 2時間 全開 1日1~2回 内服 全開 全開 1日1~2回 内服 全開 90分 1時間 1日1~2回 内服	day1 day1 day1 day1 day8 day8 day8 day15 day15~17 day15 day15~17	28日	高 中 中/軽
トリアキシン	トリアキシン	120mg/m ²	1時間	day1. 2	21日	中
G-B (濾胞性リンパ腫)	ガザイバ トリアキシン	1000mg/日 90mg/m ²	4時間 1時間	day1 (1コース目のみ: day1. 8. 15) day1. 2	28日	中/中 (中/中/-)
R-B	リツキサン トリアキシン	375mg/m ² 90mg/m ²	4時間 1時間	day1 day2. 3	28日	-/中
アドセトリス	アドセトリス	1.8mg/kg	30分	day1	21日	軽
A+AVD (ホジキンリンパ腫)	アドセトリス ドキシルビシン エクザール ダカルバジン	1.2mg/kg 25mg/m ² 6mg/m ² (最大10mg/日) 375mg/m ²	30分 30分 全開 30分	day1. 15 day1. 15 day1. 15 day1. 15	28日	高
CHASE ★ (非ホジキンリンパ腫) (ホジキンリンパ腫) (ATLL)	エンドキサン キロサイド ラステット デキサート	1200mg/m ² 2000mg/m ² 100mg/m ² 40mg/日	2時間 3時間 90分 30分	day1 day2. 3 day1~3 day1~3	21日	α/中
CHASER (非ホジキンリンパ腫)	リツキサン エンドキサン キロサイド ラステット デキサート	375mg/m ² 1200mg/m ² 2000mg/m ² 100mg/m ² 40mg/日	4時間 2時間 3時間 90分 30分	day1 day2 day3. 4 day2~4 day2~4	21日	-/α/中
CHOP ★ (非ホジキンリンパ腫) (ATLL)	エンドキサン ドキシルビシン オンコピン ブレドニン	750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² (最大2mg/日) 100mg/日	2時間 全開 全開 1日1~2回 内服	day1 day1 day1 day1~5	21日	高/-
G-CHOP (濾胞性リンパ腫)	ガザイバ エンドキサン ドキシルビシン オンコピン ブレドニン	1000mg/日 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² (最大2mg/日) 100mg/日	4時間 2時間 全開 全開 1日1回 内服 (day1は点滴:全開)	day1 (1コース目のみ: day1. 8. 15) day1 day1 day1 day1~5	21日	高/- (高/-/-)
R-CHOP (非ホジキンリンパ腫)	リツキサン エンドキサン ドキシルビシン オンコピン ブレドニン	375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² (最大2mg/日) 100mg/日	4時間 2時間 全開 全開 1日1~2回 内服	day1 day2 day2 day2 day2~6	21日	-/高/-
THP-COP ★ (非ホジキンリンパ腫) (ATLL)	エンドキサン テラルビシン オンコピン ブレドニン	750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² (最大2mg/日) 100mg/日	2時間 全開 全開 1日1~2回 内服	day1 day1 day1 day1~5	21日	高/-
R-THP-COP (非ホジキンリンパ腫)	リツキサン エンドキサン テラルビシン オンコピン ブレドニン	375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² (最大2mg/日) 100mg/日	4時間 2時間 全開 全開 1日1~2回 内服	day1 day2 day2 day2 day2~6	21日	-/高/-
DeVIC ★ (非ホジキンリンパ腫)	イホマイド ラステット カルボプラチン デカドロン	1500mg/m ² 100mg/m ² 300mg/m ² 40mg/日	2時間 2時間 1時間 1日1回 内服	day1~3 day1~3 day1 day1~3	21日	高/中
2/3DeVIC (非ホジキンリンパ腫)	イホマイド ラステット カルボプラチン デカドロン	1000mg/m ² 67mg/m ² 200mg/m ² 40mg/日	2時間 2時間 1時間 1日1回 内服	day1~3 day1~3 day1 day1~3	21日	高/中
DA-EPOCH-R (非ホジキンリンパ腫)	リツキサン ドキシルビシン オンコピン ラステット エンドキサン ブレドニン ★随注M	375mg/m ² 10mg/m ² 0.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 120mg/m ²	4時間 24時間 24時間 24時間 24時間 2時間	day1 day1~4 day1~4 day1~4 day1~4 day5 day1~5	21日	高/-/中
DA-EPOCH-R (増量版) (Level 2・3・4) (非ホジキンリンパ腫) *Level毎に用量が異なります	リツキサン ドキシルビシン* オンコピン ラステット* エンドキサン* ブレドニン ★随注M	375mg/m ² Level 2(12mg/m ²), Level 3(14.4mg/m ²), Level 4(17.3mg/m ²) 0.4mg/m ² Level 2(60mg/m ²), Level 3(72mg/m ²), Level 4(86.4mg/m ²) Level 2(900mg/m ²), Level 3(1080mg/m ²), Level 4(1296mg/m ²) 120mg/m ²	4時間 24時間 24時間 24時間 2時間	day1 day1~4 day1~4 day1~4 day5 day1~5	21日	高/-/中

ムンデシン	ムンデシン	600mg/日	1日2回	毎日	28日	-
GDP ★	ゲムシタピン シスプラチン デカドロン	1000mg/m ² 75mg/m ² 40mg/日	30分 2時間 (short hydration時は60分) 1日1回 内服	day1. 8 day1 day1~4	21日	高/-/軽
G DPR	リツキサン ゲムシタピン シスプラチン デカドロン	375mg/m ² 1000mg/m ² 75mg/m ² 40mg/日	4時間 30分 2時間 (short hydration時は60分) 1日1回 内服	day8 day1. 8 day1 day1~4	21日	高/-/軽
R-hyper-OVAD	リツキサン エンドキサン オンコピン ドキシソルビン デカドロン ★随注D	375mg/m ² 300mg/m ² /回 ×2 2mg 50mg/m ² 40mg/日 ★詳細は『局所療法レジメン』を参照	4時間 2時間/回 ・12時間毎 全開 24時間 1日1回 内服	day1 day1~3 day4. day11 day4 day1~4. day11~14 day2	14日	高/高/中/-/-
R-MA	リツキサン メトレキセート キロサイド ソルメドロール ロイコボリン ★随注D	375mg/m ² 1000mg/m ² (100mg/m ² +900mg/m ²) 2000mg/m ² /回 ×2 (4000mg/m ² /日) 50mg/回 ×2 (100mg/日) 15mg/回 ★詳細は『局所療法レジメン』を参照	4時間 24時間 (1時間+23時間) 3時間/回 ・12時間毎 全開/回 ・12時間毎	day2 day1 day2・3 day1~3	14日	中/中/中
R-CODOX-M	リツキサン エンドキサン エンドキサン オンコピン ドキシソルビン メトレキセート メトレキセート ロイコボリン ★随注A ★随注MP	375mg/m ² 800mg/m ² 200mg/m ² 1. 5mg/m ² (最大2mg/日) 40mg/m ² 536mg/m ² 2461mg/m ² 85. 7mg/m ² 12mg/m ² ★詳細は『局所療法レジメン』を参照 ★随注MP ★詳細は『局所療法レジメン』を参照	4時間 2時間 2時間 全開 30分 1時間 23時間 静注 静注 静注 ※初診時、中枢神経浸潤を認めた症例では、1コース目のみday5に追加 ※初診時、中枢神経浸潤を認めた症例では、1コース目のみday17に追加	day8 day1 day2~5 day1. 8. 15 (1コース目のみ: day1. 8) day1 day10 day10 メトレキセート終了12h後 1回目のロイコボリンより6h毎に7回投与 day1. 3 day15	21日	高/中/-/α
R-IVAC	リツキサン イホマイド ラステット キロサイド ウロミテキサン ★随注A ★随注MP	375mg/m ² 1500mg/m ² 60mg/m ² 2000mg/m ² /回 ×2 (4000mg/m ² /日) 300mg/m ² ★詳細は『局所療法レジメン』を参照 ★随注MP ★詳細は『局所療法レジメン』を参照	4時間 2時間 2時間 2時間/回 ・12時間毎 30分	day8 day1~5 day1~5 day1・2 day1~5、1日3回 (PM投与の直後・4h後・8h後に投与) day7・9 day5 ※初診時、髄液浸潤が認められた場合は、1コース目のみ追加 ※2コース目に施行	21日	中/中/中/-
イムブルピカ (マンタル細胞リンパ腫)	イムブルピカ	560mg/日	1日1回	毎日	28日	軽
イムブルピカ (小リンパ球性リンパ腫)	イムブルピカ	420mg/日	1日1回	毎日	28日	軽
MTX大量療法	メトレキセート ロイコボリン	3500mg/m ² 15mg/回	6時間 静注	day1 メトレキセート投与終了3h後より 3h毎に9回、以後6h毎に8回投与	21日	α
R-MTX大量療法	リツキサン メトレキセート ロイコボリン	375mg/m ² 3500mg/m ² 15mg/m ²	4時間 4時間 静注	day1 day2 メトレキセート投与開始24h後 より6h毎に8回投与	14日	-/α
R-MPV	リツキサン メトレキセート オンコピン プロカルバジン ロイコボリン ★随注M	375mg/m ² 3500mg/m ² 1. 4mg/m ² (最大2mg/日) 100mg/m ² 15mg/m ² /回 ★詳細は『局所療法レジメン』を参照	4時間 2時間 全開 1日1~3回 内服 静注	day1 day2 day2 day1~7(奇数コースのみ) day5 メトレキセート開始24h後より 6h毎に8回投与 day5~12の間に1回(脳脊髄液細胞診陽性時)	14日	(奇数コース) 高/高/高 (偶数コース) -/α
オブジーボ (ホジキンリンパ腫)	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
ガザイバ (濾胞性リンパ腫)	ガザイバ	1000mg/日	4時間	day1	21日 (維持療法は2ヶ月毎に2年間)	-
ボテリジオ	ボテリジオ	1mg/kg	2時間	day1・8・15・22・29・36・43・50 (オーダーは7日ごとに入力)	56日	軽
ジフォルタ	ジフォルタ	30mg/m ²	全開	day1・8・15・22・29・36	49日	軽
リツキサン	リツキサン	375mg/m ²	4時間	day1	7日	-
リツキサン【併用版】	リツキサン	375mg/m ² ★リツキサンを含むレジメンもしくは★印のあるレジメンとのみ併用可 ★リツキサン間の投与間隔: 7日	4時間	day1	7日	-
V-GAP ★ (マンタル細胞リンパ腫)	ベルケイド エンドキサン ドキシソルビン プレドニン	1. 3mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 100mg/日	全開、または皮下注 2時間 全開 1日1~2回 内服	day1. 4. 8. 11 day1 day1 day1~5	21日	高/-/-/-
VR-GAP (マンタル細胞リンパ腫)	ベルケイド リツキサン エンドキサン ドキシソルビン プレドニン	1. 3mg/m ² 375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 100mg/日	全開、または皮下注 4時間 2時間 全開 1日1~2回 内服	day1. 4. 8. 11 day1 day1 day1 day1~5	21日	高/-/-/-