

35 癌以外の疾患

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
(抗腫瘍外) CPA(注射) 参考【IPにおけるCPA】	エンドキサン	500~750mg/m ²	30分	day1	28日	中
(抗腫瘍外) CPA(内服)	エンドキサン	50~200mg/日	1日1~3回 内服	毎日	-	中
(抗腫瘍外) CPA(注射)* 【抗MDA5抗体陽性のIP】	エンドキサン	500~1000mg/m ²	30分	day1	14日	中
(抗腫瘍外) ETP 【血球貪食症候群】	ラステット	150mg/m ²	90分	day1, 4 (3コース目以降: day1)	7日	軽
イネビリズマブ	ユプリズナ	300mg/body	2時間	day1 (初回、14日後、6ヶ月後)	6ヶ月	-
インフリキシマブ 【クローン病】	インフリキシマブ	5mg/kg (最大10mg/kgを56日毎)	2時間	day1 (初回、14日、42日、以降56日毎)	56日 (最短28日まで短縮可)	-
インフリキシマブ 【潰瘍性大腸炎】	インフリキシマブ	5mg/kg	2時間	day1 (初回、14日、42日、以降56日毎)	56日	-
ナタリズマブ	タイサプリ	300mg/body	1時間	day1	28日	-
(抗腫瘍外) リツキシマブ 【ITP】	リツキシマブ	375mg/m ²	4時間	day1	7日	-
トシリズマブ	アクテムラ	8mg/kg	1時間	day1	14日 (最短7日まで短縮可)	-

* 当院の未承認医薬品等評価委員会にて承認済み。